

## 県内で「牛ボツリヌス症」を疑う事例が発生しました！

### ●牛ボツリヌス症とは・・・

- ボツリヌス菌や産生された毒素を含む飼料などの摂取により発症。
- 発症牛は突然の起立不能(特に後躯の麻痺)、腹式呼吸、食欲廃絶等を起こし、高い割合で死亡します。
- 品質の悪いサイレージ、野鳥等の糞に汚染された飼料・水の摂取が原因
- 牛ボツリヌス症を発症させる菌は牛特有の菌で人には感染しません。

### 発生防止のために・・・

「飼養衛生管理基準」の遵守徹底をお願いします。

特に・・・

- 品質の悪いサイレージは給与しない
- 野生動物、野鳥(特にカラス)の侵入防止
- 餌槽・水槽の定期的な清掃、点検
- 消毒の励行

予防対策として・・・

- ワクチン接種、生菌剤の投与

### ●ボツリヌス菌に有効な消毒薬の作り方

ボツリヌス菌は大変強いいため限られた消毒薬しか効きません！

市販の消毒薬

次亜塩素酸系:ビルコンS  
アルデヒド系:グルターZ  
ヨード系:クリンナップ

例) ビルコンS:20g

いずれも500倍希釈して使用！



水  
10L

### 滋賀県家畜保健衛生所

(本所) 近江八幡市西本郷町226-1 TEL: 0748-37-7511 FAX: 0748-37-4821 緊急携帯: 090-3613-7486	(北西部支所) 高島市今津町弘川249-1 TEL: 0740-22-2145 FAX: 0740-22-6681 緊急携帯: 080-6176-8052
--	--