

滋 農 技 セ 第 286 号
令和 8 年（2026 年）6 月 16 日

関係機関の長 様

滋賀県農業技術振興センター所長
（ 公 印 省 略 ）

令和 8 年度一番茶萌芽状況および実収について（報告）

このことについて、別紙のとおり報告します。

担当：滋賀県農業技術振興センター
茶業指導所 西野 智樹
TEL 0748-62-0276
FAX 0748-62-7095

令和 8 年度一番茶萌芽状況報告

滋賀県農業技術振興センター茶業指導所

1. 萌芽期

本 年	前 年	前5か年
4月 8日	4月 7日	4月 5日

2. 生育状況

項目	年次	4月17日	4月22日	4月27日	5月2日	5月7日
新芽長 (cm)	本年	0.87 ± 0.34	2.25 ± 0.69	4.26 ± 1.14	6.98 ± 1.49	9.81 ± 1.88
	前年	1.01 ± 0.30	2.57 ± 0.79	4.57 ± 1.35	6.98 ± 2.15	8.96 ± 2.76
	前5か年	1.13 ± 0.44	2.38 ± 0.80	4.36 ± 1.28	6.55 ± 1.79	8.46 ± 2.29
新葉数 (枚)	本年	0.36 ± 0.53	1.26 ± 0.53	1.76 ± 0.62	2.78 ± 0.71	3.62 ± 0.49
	前年	0.26 ± 0.44	1.40 ± 0.53	2.30 ± 0.61	3.06 ± 0.59	3.82 ± 0.60
	前5か年	0.60 ± 0.58	1.53 ± 0.62	2.30 ± 0.64	3.14 ± 0.60	3.83 ± 0.62

3. 気象表

項目・年次 月・旬	平均気温 (°C)			最高気温 (°C)			最低気温 (°C)		
	本年	前年	平年	本年	前年	平年	本年	前年	平年
1月 上旬	3.0	3.0	3.0	8.8	8.2	8.1	-1.2	-0.9	-1.2
	中旬	4.5	3.4	2.7	12.3	9.4	7.9	-1.4	-1.4
	下旬	0.8	3.8	2.4	6.0	9.8	7.4	-2.7	-1.1
2月 上旬	2.0	1.8	2.3	8.5	6.9	7.7	-3.1	-1.9	-2.2
	中旬	5.1	2.7	3.3	11.7	8.2	8.7	-0.9	-1.6
	下旬	9.5	2.8	4.3	14.9	8.8	10.0	4.2	-1.6
3月 上旬	6.1	6.1	5.3	11.3	11.4	11.0	1.1	1.7	0.4
	中旬	6.4	6.4	6.6	12.8	11.3	12.8	0.0	2.0
	下旬	11.3	11.0	8.0	18.7	17.7	14.2	4.6	4.4
4月 上旬	12.8	10.8	10.2	18.3	17.4	16.6	7.7	4.6	4.3
	中旬	15.8	14.5	12.2	21.9	20.6	18.6	9.9	7.8
	下旬	14.6	14.6	13.8	19.6	21.8	20.1	9.6	7.8
5月 上旬	16.2	15.4	15.9	22.3	20.9	22.2	10.4	9.1	10.1

項目・年次 月・旬	降水量 (mm)			降水日数 (日)		
	本年	前年	平年	本年	前年	平年
1月 上旬	10.0	13.0	16.3	4	2	3.9
	中旬	0.0	7.5	19.0	0	5
	下旬	11.5	0.0	23.9	6	0
2月 上旬	6.0	26.0	19.1	4	6	4.4
	中旬	3.5	9.3	25.5	2	7
	下旬	1.0	1.3	21.9	1	4
3月 上旬	2.0	13.8	30.9	3	7	4.5
	中旬	7.5	11.5	31.0	2	7
	下旬	6.5	8.5	37.4	5	1
4月 上旬	41.5	7.0	35.4	6	4	3.7
	中旬	15.5	19.0	33.0	1	2
	下旬	78.5	10.0	33.6	5	3
5月 上旬	43.5	89.5	39.3	3	4	3.5

終 霜 日 本年 4月 22日 (最低気温 3.3°C) 前年 4月 14日 (最低気温 3.9°C)
 最低極温 本年 -4.4°C (2月 1.4.9日) 前年 -5.7°C (2月 7日)

4. 供試園の条件

品 種	定植年次	栽植密度	樹高	株張り	その他
やぶきた	昭和31年3月 (70年生)	180cm×30cm	113cm	161cm	可搬式摘採機管理ほ場 防霜ファン設置ほ場

年間施肥成分量 (kg/10a) N:53.3 P₂O₅:16.0 K₂O:19.0

5. 概況

1) 気象

本年の気温は、1月下旬に平年を下回ったほかは、5月上旬にかけて、平年並みか平年より高く推移した。最高気温と最低気温も同様に5月上旬にかけて平年より高く推移した。

各月の降水量は、1月が21.5 mm(平年比 36%)、2月が10.5 mm(同 16%)、3月が16.0 mm(同 16%)で平年よりかなり少なく推移したが、4月が135.5 mm(同 133%)、5月上旬が(同 111%)で、平年より多かった。

2) 生育

2月から4月上旬にかけての気温は平年並みか高めで推移したが、1月から3月にかけての降水量が平年よりかなり少なく推移したため新芽の動き出しはやや緩慢となった。このため、一番茶萌芽期は、前年より1日遅く、前5か年平均より3日遅い4月8日となった。

その後、4月から5月上旬にかけての平均気温が平年より高く、降水量も多かったため、新芽の生育は早まった。

令和 8 年度一番茶実収報告

滋賀県農業技術振興センター茶業指導所

1. 摘採日

本 年	前 年	前5か年
5月 7日	5月 8日	5月 6日

2. 生葉収量 (kg/10a)

本 年		前 年		前5か年	
収 量	指数	収 量	指数	収 量	指数
637 ± 70	132	469 ± 23	97	484 ± 57	100

3. 百芽重 (g)

本 年		前 年		前5か年	
重 量	指数	重 量	指数	重 量	指数
45.8 ± 3.2	106	49.4 ± 3.4	115	43.0 ± 3.6	100

4. 新芽数 (本/m²)

本 年		前 年		前5か年	
芽 数	指数	芽 数	指数	芽 数	指数
1117 ± 98	91	1037 ± 47	84	1231 ± 98	100

5. 出開度 (%)

本 年	前 年	前5か年
32	40	39

6. 概況

1) 生育

本年の一番茶は、萌芽期が前年より1日遅く、前5か年平均より3日遅かったものの、4月から5月上旬にかけての平均気温が平年より高く、降水量も多かったため、その後の生育が早まり、摘採日は前年より1日早く、前5か年平均より1日遅い5月7日であった。

百芽重は前5か年平均とほぼ同等（106％）で、新芽数も前5か年平均とほぼ同等（91％）であった。生葉収量は前5か年平均より多かった（132％）。

2) 県内の状況

平坦地の摘採始めは5月3日頃で平年よりやや遅く、山間地は5月3日頃で平年並みとなった。収量は平坦地、山間地ともに平年並みであった。

3) 病虫害の発生

病虫害の発生は少なく、一番茶の生育・収量への影響はなかった。