

滋 農 技 セ 第 3 2 0 号
令和8年(2026年) 7月 21日

関係機関の長 様

滋賀県農業技術振興センター所長
(公 印 省 略)

令和8年度二番茶実収について(報告)

このことについて、本県における令和8年度二番茶の調査結果を別紙のとおり取りまとめましたので報告します。

担当：滋賀県農業技術振興センター
茶業指導所 西野 智樹
TEL 0748-62-0276
FAX 0748-62-7095

令和 8 年度二番茶実収報告

滋賀県農業技術振興センター茶業指導所

1. 摘採日

本 年	前 年	前5か年
6月24日	6月30日	6月28日

2. 生葉収量 (kg/10a)

本 年		前 年		前5か年	
収 量	指数	収 量	指数	収 量	指数
555 ± 49	98	654 ± 92	115	569 ± 95	100

3. 百芽重 (g)

本 年		前 年		前5か年	
重 量	指数	重 量	指数	重 量	指数
48.9 ± 2.5	100	61.8 ± 3.5	126	49.0 ± 4.8	100

4. 新芽数 (本/m²)

本 年		前 年		前5か年	
芽 数	指数	芽 数	指数	芽 数	指数
1131 ± 317	103	1053 ± 107	96	1098 ± 137	100

5. 出開度 (%)

本 年	前 年	前5か年
58	67	70

6. 気象表

項目・年次 月・旬	平均気温 (°C)			最高気温 (°C)			最低気温 (°C)		
	本年	前年	平年	本年	前年	平年	本年	前年	平年
5月	中旬	20.3	19.3	16.7	28.6	25.5	22.9	12.9	14.1
	下旬	20.8	18.3	18.3	25.7	23.7	24.4	16.4	14.1
6月	上旬	19.9	19.4	19.6	24.5	24.9	25.3	16.7	14.4
	中旬	22.1	24.1	21.0	27.9	29.4	26.1	17.2	19.3
	下旬	21.8	25.6	22.4	25.5	31.2	27.4	19.0	21.2

項目・年次 月・旬	降水量 (mm)			降水日数 (日)		
	本年	前年	平年	本年	前年	平年
5月	中旬	0.0	15.5	54.9	0	3
	下旬	37.0	45.0	43.7	5	5
6月	上旬	131.5	79.5	37.3	6	3
	中旬	19.5	66.5	67.4	5	5
	下旬	160.5	61.5	76.8	6	5

7. 供試園の条件

品 種	定植年次	栽植密度	樹高	株張り	その他
やぶきた	昭和31年3月 (70年生)	180cm×30cm	116cm	167cm	防霜ファン設置ほ場

年間施肥成分量 (kg/10a) N:53.3 P₂O₅:16.0 K₂O:19.0

8. 概況

1) 気象

5月中旬と下旬の平均気温は平年よりかなり高く、6月上旬から下旬にかけては平年並みか高く推移した。降水量は5月中旬と6月中旬は平年より少なく、6月上旬と下旬は平年よりかなり多かった。

2) 生育

一番茶摘採日が前5か年平均に比べ1日遅かった(5月7日)ものの、以後の平均気温が平年より高く推移する期間が多かったため生育が早まり、二番茶摘採日は前年より6日、前5か年平均より4日早い6月24日となった。また、一番茶摘採日から二番茶摘採日までの日数は、前5か年より4日早い48日であった。

摘芽状況は、新芽数、百芽重ともに前5か年並みであることから、生葉収量は前5か年並みの555kg/10aとなった。

3) 県内の状況

二番茶の摘採始めは、山間地は6月20日頃と平年並み、平坦地も6月18日頃と平年並みであった。収量は平坦地、山間地ともに平年並みであった。

4) 病虫害の発生

所内では、クワシロカイガラムシの発生が多く、茶園の一部で新芽の生育抑制が見受けられた。