3) 平成5年のアユ漁況予測

西森克浩

〔目的〕琵琶湖産アユの円滑な需要を図るための基礎資料の収集と精度の高い予報を目標として、それに関する各種調査を実施し、漁況予測を行う。

〔方法〕魚探調査、漁獲状況調査、成育状況調査、産卵調査、ヒウオ生息状況調査、餌料生物調査等各種調査と漁獲統計の整理解析を行い、アユ漁況の予測を行った。

〔結果〕各種の調査結果をもとに、年間（2月から8月）の漁獲尾数（ C_N ）と平均体重（ w ）と漁獲重量（ C_w ）の予測を行った。

漁獲尾数の予測式は、

$$C_N = \frac{0.26521}{0.037256 + \frac{1}{N}} \quad (1)$$

となった（ $R=0.97^{**}$ ）。 N は11月と12月のヒウオ平均採集尾数の計である。漁獲尾数は琵琶湖に添加されたアユの生息数に比例した。

平均体重の予測式は、

$$w = 4.59147 - 0.21889 \cdot C_N - 0.04503 \cdot S \quad (2)$$

となった（ $R_{aj}=0.88^{**}$ ）。 S は前年11月から1月の積雪日数の計（観測地点は虎姫、春照、彦根）である。平均体重には、アユの生息数と積雪日数がともに負の要因として働いた。

漁獲重量の予測式は、

$$C_w = 2050 - 30.81 \cdot S \quad (3)$$

となった（ $R=0.86^{**}$ ）。漁獲重量は、漁獲尾数と平均体重の積によって求められ、その式には、 N 、 C_N 、 S の3つの説明要因が含まれる。しかし、近年は、アユに関する漁業規制や増殖対策が効果的に行われているので、アユの生息数が極端に低くなるということがなくなったため、（1）式での N と（2）式での C_N が極端に少なくなるということがなくなった。そのため、漁獲重量は、人為的に操作できない環境要因 S によってのみ強い影響を受けており、その結果、（3）式で漁獲重量の予測が可能になっているものと考えられる。本年度のヒウオ生息密度は、一曳網当たり542尾と、平年値の468尾の1.2倍で、積雪日数は8.3日と、平年値18.6日の0.45倍で（彦根地方气象台調べ）あった。これらの値を上記の式に代入した結果、平成5年の漁獲尾数は、6億8千万尾（平年値：6億3千万尾）、漁獲魚の平均体重は、2.7g（平年値：2.4g）、総漁獲重量は、1,800トン（平年値：1,476トン）と推定された。

図1 ヒウオ平均採集尾数と年間漁獲尾数の関係

図2 年間漁獲量の理論値と実測値