

平成25年度二番茶実収報告

滋賀県農業技術振興センター茶業指導所

1. 摘採日

本年	前年	前5ヶ年
7月17日	7月2日	6月28日

2. 生葉収量 (kg/10a)

本年		前年		前5ヶ年	
収量	指数	収量	指数	収量	指数
288 ± 8	45	467 ± 55	73	639 ± 53	100

3. 百芽重 (g)

本年		前年		前5ヶ年	
重量	指数	重量	指数	重量	指数
27.7 ± 3.2	65	48.8 ± 7.1	115	42.4 ± 4.5	100

4. 新芽数 (本/m²)

本年		前年		前5ヶ年	
芽数	指数	芽数	指数	芽数	指数
1098 ± 101	86	744 ± 99	58	1278 ± 171	100

5. 出開度 (%)

本年	前年	前5ヶ年
64	68	78

6. 気象表

項目・年次 月・旬	平均気温 (°C)			最高気温 (°C)			最低気温 (°C)			
	本年	前年	平年	本年	前年	平年	本年	前年	平年	
6月	上旬	20.6	19.8	19.3	27.1	25.2	25.0	14.8	15.3	14.3
	中旬	23.6	20.5	20.7	29.1	24.7	25.7	19.1	17.0	16.5
	下旬	21.3	20.2	22.1	25.4	25.0	26.8	18.1	16.1	18.4
7月	上旬	25.9	22.9	23.6	31.6	27.6	28.5	20.7	19.4	19.8
	中旬	25.9	26.4	24.6	31.9	31.4	29.5	21.2	22.3	20.8

項目・年次 月・旬	降水量 (mm)			降水日数 (日)			
	本年	前年	平年	本年	前年	平年	
6月	上旬	0.0	34.5	36.0	0	3	3.2
	中旬	130.0	123.0	72.9	3	5	5.3
	下旬	80.0	116.0	77.9	6	5	5.7
7月	上旬	21.5	143.5	73.7	5	5	5.7
	中旬	23.5	61.5	67.4	4	4	4.6

7. 供試園の条件

品 種	定植年次	栽植密度	樹高	株張り	その他
やぶきた	昭和31年3月 (58年生)	180cm×30cm	95cm	161cm	

年間施肥成分量 (kg/10a) N:46.9 P₂O₅:12.8 K₂O:20.8

8. 概況

1) 気象

6月上旬から7月中旬にかけての平均気温は、6月下旬が平年比-0.8°Cとやや低かった以外は、平年比+1.3~2.9°Cと高かった。

降水量は、6月上旬は高気圧に覆われて雨が降らなかったが、6月中・下旬は梅雨前線の影響で大雨が降るなど平年並みから多めで推移した。7月に入ると少雨の日が多く、平年より少なかった。

2) 生育

本年は凍霜害の影響で一番茶の摘採日が前年より25日遅く前5ヶ年平均より23日遅くなったことから、二番茶摘採日は前年より15日遅く前5ヶ年平均より19日遅い7月17日となった。また、一番茶摘採日(6月4日)から二番茶摘採日までの日数は43日と、前5ヶ年平均より4日短かった。

本年の摘芽状況は、百芽重が前5ヶ年平均より35%小さく、新芽数が前5ヶ年平均より14%少なかった。生葉収量は288kg/10aと、前5ヶ年平均より55%少なかった。

3) 県下の状況

二番茶の摘採始めは、平坦地で6月23日頃、山間地で6月27日頃と平年並みとなった。また、収量は芽数が少なく不揃いで、平年に比べ2割程度少なかった。

4) 病害虫の発生

チャノサビダニ、カンザワハダニ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイの発生が平年に比べて多く、一部で被害がみられた。