

平成24年度二番茶実収報告

滋賀県農業技術振興センター茶業指導所

1. 摘採日

本年	前年	前5ヶ年
7月2日	7月1日	6月28日

2. 生葉収量 (kg/10a)

本年		前年		前5ヶ年	
収量	指数	収量	指数	収量	指数
467 ± 55	73	483 ± 63	75	644 ± 55	100

3. 百芽重 (g)

本年		前年		前5ヶ年	
重量	指数	重量	指数	重量	指数
48.8 ± 7.1	116	34.0 ± 1.8	81	42.2 ± 3.6	100

4. 新芽数 (本/m²)

本年		前年		前5ヶ年	
芽数	指数	芽数	指数	芽数	指数
744 ± 99	58	1331 ± 171	103	1287 ± 164	100

5. 出開度 (%)

本年	前年	前5ヶ年
68	78	79

6. 気象表

項目・年次 月・旬	平均気温 (°C)			最高気温 (°C)			最低気温 (°C)		
	本年	前年	平年	本年	前年	平年	本年	前年	平年
5月 中旬	15.1	17.2	16.1	21.1	23.9	22.2	9.3	10.7	10.6
下旬	17.7	17.2	17.7	24.6	21.4	23.6	11.7	13.8	12.7
6月 上旬	19.8	19.6	19.3	25.2	25.0	25.0	15.3	15.4	14.3
中旬	20.5	19.8	20.7	24.7	23.8	25.8	17.0	16.6	16.5
下旬	20.2	27.2	22.2	25.0	33.2	26.9	16.1	21.8	18.6
7月 上旬	22.9	26.0	23.6	27.6	31.8	28.5	19.4	21.6	19.8

項目・年次 月・旬	降水量 (mm)			降水日数 (日)		
	本年	前年	平年	本年	前年	平年
5月 中旬	18.5	107.0	59.6	3	4	4.7
下旬	14.0	199.5	49.5	5	8	4.1
6月 上旬	34.5	28.0	36.1	3	4	3.2
中旬	123.0	130.0	70.5	5	8	5.3
下旬	116.0	5.0	76.1	5	1	5.7
7月 上旬	143.5	60.0	70.4	5	6	5.7

7. 供試園の条件

品 種	定植年次	栽植密度	樹高	株張り	その他
やぶきた	昭和31年3月 (57年生)	180cm×30cm	91cm	163cm	防霜ファン・レール設置圃場

年間施肥成分量 (kg/10a) N:46.9 P₂O₅:12.8 K₂O:20.8

8. 概況

1) 気象

平均気温は、5月中旬から6月下旬にかけて平年比+0.5°C～-2.0°Cと、平年並みから低めで推移した。

降水量は、5月中・下旬が平年の28～31%とかなり少なかったが、6月中・下旬が梅雨前線や台風の影響で平年の152～174%と多かった。

2) 生育

本年の二番茶摘採日は前5ヶ年平均より4日遅い7月2日となった。また、一番茶摘採日（5月10日）から二番茶摘採日までの日数は53日と、5月中下旬の少雨と生育期間中の低温などの影響で前5ヶ年平均より7日長かった。

本年の摘芽状況は、百芽重が前5ヶ年平均より16%重く、新芽数が前5ヶ年平均より42%少なかった。生葉収量は467kg/10aと、新芽数が減った影響で前5ヶ年平均より27%少なかった。

3) 県下の状況

二番茶の摘採始めは、平坦地で6月22日頃、山間地で6月28日頃と平年並みとなったが、6月下旬から7月上旬にかけて気温が平年を下回ったため、摘採期間は長くなった。また、収量は、芽伸びが悪く、平年に比べ2割程度少なかった。

4) 病害虫の発生

チャノココクモンハマキ、チャハマキおよびチャノホソガの発生が平年に比べ多く、一部で被害がみられた。