低 DO がイサザの逃避行動に及ぼす影響の評価（水槽実験による）

上野 世司

1. 研究目的

地球温暖化は、琵琶湖の深層部の低酸素化をもたらすことが危惧されている。溶存酸素 (DO) 条件がイサザの逃避行動に及ぼす影響について水槽実験を行った。

2. 研究方法

水温 12.9~13.2°C、DO 3.44 ± 0.13 mg/L に調整した透明水槽 (図 1) にイサザ (BL 56.8 ± 5.0 mm) を 10 尾入れ、別水槽で DO を 3 段階 (L: 0.52 ± 0.03 mg/L、M: 1.49 ± 0.02 mg/L、H: 3.61 ± 0.01 mg/L)、水温を 9.4~9.5°C に調整した水を水槽下部から注入 (約 0.4L/min) し、水槽内に水温および DO の鉛直勾配を形成した。注水は 60 分間継続し、その間 5 分毎に、水槽を上下 5 層 (下から層 i ~ 層 v) の範囲に区分し、層毎に水温、DO (層 i を除く)、イサザ個体数を記録した。水温 10.0°C 以下になった層を下層域、それ以外を上層域に区分し、上層域のイサザを逃避個体とみなして、逃避率 (注水開始後 35 分以降の平均値) を算出した。実験は、試験区毎に 3 回ずつ行った (表 1)。

3. 研究結果

実験をとおして死亡したイサザは、DO (L) において死亡した 1 尾だけであった。逃避率は、DO (L) $41.1 \pm 4.2\%$ 、DO (M) $6.7 \pm 11.5\%$ 、DO (H) $0.0 \pm 0.0\%$ であり、DO の違いは逃避率に影響を与え (図 2, $p < 0.05$, Kruskal-Wallis test)、イサザの低 DO 水からの逃避行動が確認された。

しかし、行動が顕著になる DO レベルは約 1mg/L 以下と低く、また逃避時の行動も緩慢であり、全体として逃避行動はきわめて低調なことが示唆された。

本報告は農林水産技術会議の委託事業「平成 22 年度地球温暖化が水産分野に与える影響評価と適応技術の開発」の成果の一部である。

図1 イサザの逃避実験に使用した水槽 (単位は mm)。

表1 イサザの逃避実験における水温および DO の設定条件。

項目	開始時 (i-v 層)		注入水		終了時		
	最低	最高	最低	最高	層	Min ~ Max	
WT (°C)	12.9 ~ 13.2	13.2	9.4 ~ 9.5	9.5	v	10.9 ~ 12.2	
					iv	9.9 ~ 10.9	
					iii	9.5 ~ 10.0	
					ii	9.4 ~ 9.8	
					i	9.5 ~ 9.8	
DO (mg/L)	平均 3.44 ± 0.13	SD	区	平均 0.52 ± 0.03	SD	区	平均 0.78 ± 0.01
						DO(L)	0.52 ± 0.03
						DO(M)	1.49 ± 0.02
						DO(H)	3.61 ± 0.01
終了時の DO は層 i の値。

図2 試験区毎のイサザの逃避率の比較。

DO は逃避率に影響を与えた ($p < 0.05$, Kruskal-Wallis test)。
DO(L): 0.78 ± 0.01 , DO(M): 1.69 ± 0.00 , DO(H): 3.77 ± 0.03 。