

## カメムシ防除は出穂10日後頃 (粒剤は出穂7日後頃)に行いましょう!

### 《生育状況と防除時期》

イネの生育は、4月下旬から5月上旬の田植では、平年並となっています。斑点米カメムシ類の防除が遅れないように注意しましょう。



写真：滋賀県病害虫防除所

斑点米カメムシ類に対する薬剤防除の適期は、出穂7～10日後です。粒剤を施用する場合は、田面を露出させない程度に浅く湛水して、散布しましょう。

### 《防除時期のめやす》

#### 【コシヒカリ】

移植時期	出穂期予想	防除時期	
		粒剤	粉剤・液剤
5月上旬植	7/28～31	8/4～7	8/7～10
5月中旬植	8/1～4	8/8～11	8/11～14

#### 【みずかがみ】防除時期が「コシヒカリ」より早いので注意!!

移植時期	出穂期予想	防除時期	
		粒剤	粉剤・液剤
4月下旬植	7/15～20	7/22～27	7/25～30
5月上旬植	7/19～22	7/26～29	7/29～8/1

雑草管理が不十分な畦畔でイネの出穂期以降に草刈りを行うと、斑点米カメムシ類を水田内に追い込むことになり、被害が増大する恐れがあります。やむなく行う場合は、薬剤防除直前に実施しましょう。