

接种新型冠状病毒感染疫苗后



身体有不适反应时

接种后, 在数日内可能出现的症状

※与第一次相比第二次注射后出现症状的可能性大

- | | |
|-------------|----------------|
| ● 注射部位肿, 痛 | 🕒 注射当天起持续2天左右 |
| ● 肌肉痛, 关节痛 | 🕒 注射第二天起持续1天左右 |
| ● 头痛 | 🕒 注射第二天起持续1天左右 |
| ● 疲倦感、寒冷、发烧 | 🕒 注射第二天起持续1天左右 |



※ 也可能会有疲倦感、恶心 拉肚子・呕吐等症状

参照 日本医学会副作用等说明书

这些症状几天内就会消除 请暂时观察

发烧・疼痛严重重者

可以服用药店的镇痛解热药、
如果担心 请咨询 [医生](#)或[药剂师](#)・[药店](#)



来急诊之前!



症状持续者

请首先联系 [县接种疫苗专用咨询窗口](#)

关于副作用等问题的咨询在这里

※预约接种疫苗等问题请联系各市町窗口

滋贺县新冠状病毒疫苗专门咨询窗口

FAX 077-528-4867

9:00~18:00 TEL 077-528-3588

18:00~9:00 TEL 077-528-3621