

## 3. 無人航空機 (無人ヘリコプター等)

## (1) 水稻 (殺菌・殺虫剤)

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
  - ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
  - ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
  - ・夏期一斉防除では、トレボン、MRジョーカーについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病虫害 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
カスミンパリタシン液剤	カスガマイシン・パリ タシン液剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		紋枯病						
カスミン液剤	カスガマイシン液剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
ダブルカットフロアブル	カスガマイシン・トリシ クラゾール水和剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
トライフロアブル	テフフロキン水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		稲こうじ病						
ノンブラスフロアブル	トリシクラゾール・フェリ ムゾン水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
パシタックゾール	メフロニル水和剤	紋枯病	6～8倍	収穫14日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
パリタシンエア	パリタマイシン液剤	紋枯病	8倍	収穫14日前 まで	5回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
ビームエイトゾール	トリシクラゾール水和 剤	いもち病	5～8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
フジワン乳剤	イソフロチオラン乳剤	いもち病	8倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
ブラシゾール	フェリムゾン・フサイ ト水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		もみ枯細菌 病						
モンカットフロアブル	フルトラニル水和剤	紋枯病	8倍	収穫14日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
モンカットラフサイト <sup>20F</sup>	フサイト・フルトラニ ル水和剤	いもち病	6～8倍	収穫14日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		紋枯病						
モンセレンフロアブル	ペンシクロン水和剤	紋枯病	8～10倍	収穫21日前 まで	4回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
ラフサイトパリタフロア ブル	パリタマイシン・フサイ ト水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前 まで	3回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		紋枯病						
ラフサイトフロアブル	フサイト水和剤	いもち病	5～8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
MRジョーカーEW	シラフルオフェン乳剤	ウンカ類	16倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		カメムシ類						
		コブノメイカ						
		ツマグロヨコバイ						

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください
- ・夏期一斉防除では、トレボン、MR:ジョーカーについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
エクスト°フロアブル	スルホキサフロル水和剤	ウカ類	16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
		カメムシ類						
		ツマグ°ロヨコハ°イ						
エミリアフロアブル	フルビ°リミン水和剤	ウカ類	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
		カメムシ類						
		ツマグ°ロヨコハ°イ						
キラップ°フロアブル	エチフ°ロール水和剤	ウカ類	8~16倍	収穫14日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
		カメムシ類						
スターケルメイト液剤10	ジ°ノテフラン液剤	ウカ類	16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
			30倍					
			8倍					
		カメムシ類	ツマグ°ロヨコハ°イ					
スターケル液剤10	ジ°ノテフラン液剤	ウカ類	16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
			30倍					
			8倍					
		カメムシ類	ツマグ°ロヨコハ°イ					
スミチオンMC	MEPマイクロカフ°セル剤	カメムシ類	3.2~4倍	収穫21日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
スミチオン乳剤	MEP乳剤	カメムシ類	8倍	収穫21日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
		ニカメイチュウ						
スミハ°ツサMC	BPMC・MEPマイクロカフ°セル剤	ウカ類	3倍	収穫21日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
		カメムシ類						
ダ°ントツフロアブル	クロチアニジン水和剤	ウカ類	24倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
		カメムシ類						
トレボン°ンエアー	エトフェン°ロックス乳剤	イナゴ°類	8倍	収穫14日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
		ウカ類						
		カメムシ類						
		コブ°ノメイカ°						
		ツマグ°ロヨコハ°イ						
	フタオビ°コヤカ°							

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボン、MR:ジョーカーについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
トレボンスカイMC	エトフェン <sup>®</sup> ロックスマイ クロカブ <sup>®</sup> セル剤	カメムシ類	16倍	収穫14日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ヒメトビ <sup>®</sup> ウカ						
ダブルカットKフロアブル	エチフ <sup>®</sup> ロール・カサガ <sup>®</sup> マ イシン・トリシクラゾ <sup>®</sup> ル 水和剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		カメムシ類						
ダブルカットスタークルフロ	シノテフラン <sup>®</sup> ・カサガ <sup>®</sup> マ イシン・トリシクラゾ <sup>®</sup> ル 水和剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類						
		カメムシ類						
ダブルカットトレボンフロ	エトフェン <sup>®</sup> ロックス・カ サガ <sup>®</sup> マイシン・トリシクラ ゾ <sup>®</sup> ル水和剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類						
		カメムシ類						
		ツマグ <sup>®</sup> ロヨコバ <sup>®</sup> イ						
トライKフロアブル	エチフ <sup>®</sup> ロール・テブ <sup>®</sup> フロ キン水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		ウカ類						
		カメムシ類						
ノンプラスダントツフロアブ	クロチアニジン <sup>®</sup> ・トリシク ラゾ <sup>®</sup> ル・フェリムゾ <sup>®</sup> ン 水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類						
		カメムシ類						
ビームエイトEXゾル	スルキサフロ <sup>®</sup> ・トリシク ラゾ <sup>®</sup> ル水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		ウカ類						
		カメムシ類						
ビームエイトエクストゾル	スルキサフロ <sup>®</sup> ・トリシク ラゾ <sup>®</sup> ル水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		ウカ類						
		カメムシ類						
ビームエイトスタークルゾル	シノテフラン <sup>®</sup> ・トリシク ラゾ <sup>®</sup> ル水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類						
		カメムシ類						
		ツマグ <sup>®</sup> ロヨコバ <sup>®</sup> イ						
ビームエイトトレボンゾル	エトフェン <sup>®</sup> ロックス・ト リシクラゾ <sup>®</sup> ル水和 剤	いもち病	5倍	収穫14日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類						
		カメムシ類						

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
  - ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
  - ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
  - ・夏期一斉防除では、トレボン、MR:ジョーカーについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
ブラシキラップ フロアブ	エチフ ロール・フェリム ゾン・フサライド 水 和剤	いもち病	8倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
ブラシシヨーカーフロアブ	シラフルオフェン・フェリム ゾン・フサライド 水 和剤	いもち病	8倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
ブラシダントツフロアブ	クロチアミン・フェリム ゾン・フサライド 水 和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
ブレードスタークルゾル	シノテフラン・フェリム ゾン・フサライド 水 和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
		ツマゲ ロヨコハイ						
		もみ枯細菌 病 稲こうじ病						
ラブサイトジョーカーフロ	シラフルオフェン・フサライ ド 水和剤	いもち病	4倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
ラブサイトスタークルフロア	シノテフラン・フサライ ド 水和剤	いもち病	4倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
ラブサイトダントツフロア	クロチアミン・フサライ ド 水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						

## (2) 水稻(除草剤)

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指していう通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
アットウZ400FG	テフリルトリオン・ヒラクロニル・フロピリスルフロンの粒剤	移植 水稻	アミト・ロ・藻類による表層はく離	400g/ 10a	移植後3日～ヒ <sup>1</sup> 3葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
アットウZ700Aフル	テフリルトリオン・ヒラクロニル・フロピリスルフロンの水和剤	移植 水稻	ウリカ	500mL/ 10a	移植後3日～ヒ <sup>1</sup> 3葉期ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			エゾノヤヌカ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											
アッパレZ400FG	ヒラクロニル・フロピリスルフロンのプロモチドの粒剤	移植 水稻	アミト・ロ・藻類による表層はく離	400g/ 10a	移植後3日～ヒ <sup>1</sup> 3葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			エゾノヤヌカ								
一年生雑草及び多年生広葉雑草											
アトト豆つぶ250	ヒリスルファン剤	移植 水稻	ヒ <sup>1</sup> エ	250g/ 10a	移植後14日(稲5葉期以降)～ヒ <sup>1</sup> 4葉期但し、収穫45日前まで	1回	湛水散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			多年生広葉雑草								
イネキング700Aフル	ヒラクロニル・ヒラゾレート・ベンゾピシロン水の和剤	移植 水稻	ウリカ	500mL/ 10a	移植直後～ヒ <sup>1</sup> 2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			オモダカ								
			クログワイ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性											
ウイナ-Ｌ7フロアブル	イフ・フェンカルハ ゾン・ブ・ロモフ チド・ベンスルフ ロンメチル水和 剤	移植 水稲	アミド・ロ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～ヒ <sup>°</sup> E2.5 葉期 但 し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人ヘリ コプターに よる滴下		無人ヘリコプター による滴下 のみとする。	普	I											
			ウリカワ																			
			オモダカ																			
			クログワイ																			
			セリ																			
			ヒルムシロ																			
			ヘラオモダカ																			
			ホタルイ																			
			マツハイ																			
			ミスガヤツリ																			
			水田一年生雑草																			
ウイニングランフロアブル	イフ・フェンカルハ ゾン・ブ・ロモフ チド・ベンスルフ ロンメチル水和 剤	移植 水稲	アミド・ロ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～ヒ <sup>°</sup> E2.5 葉期 但 し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I											
			ウリカワ																			
			オモダカ																			
			クログワイ																			
			シスイ																			
			セリ																			
			ヒルムシロ																			
			ヘラオモダカ																			
			ホタルイ																			
			マツハイ																			
			ミスガヤツリ																			
一年生雑草																						
エーワンフロアブル	オキサジクロメソ ン・テフリルトリオン 水和剤	移植 水稲	ウリカワ	500mL /10a	移植後5日 ～ヒ <sup>°</sup> E3葉 期 但し、 移植後30 日まで	1回	原液湛水 散布又は 水口施用 又は無人 ヘリコプター による滴 下	砂壤 土～ 埴土	無人ヘリコプター による滴下 のみとする。	普	I											
			オモダカ																			
			クログワイ(北海道を 除く)																			
			セリ(北陸を除く)																			
			ヒルムシロ																			
			ホタルイ																			
			マツハイ																			
			ミスガヤツリ(北海道 を除く)																			
			水田一年生雑草																			
			カイリキZフロアブル									イフ・フェンカルハ ゾン・テフリルトリ オン・ブ・ロビリス ルフロン水和剤	移植 水稲	ウリカワ	500mL /10a	移植後3日 ～ヒ <sup>°</sup> E3葉 期 但し、 移植後30 日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
														オモダカ								
クログワイ																						
コウキカウ																						
セリ																						
ヒルムシロ																						
ヘラオモダカ																						
ホタルイ																						
マツハイ																						
ミスガヤツリ																						
一年生雑草																						

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壤	備考	毒 性	魚 毒 性
カウンシルコンプレイト フロアブル	テフリトリオン・ト リアフェモン水和 剤	移植 水稻	ウリカワ	500mL /10a	移植後5日 ～ヒ <sup>レ</sup> I3.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。 ※薬害を 生じるおそ れがあるので、 後作物として なす、たまね ぎおよびさ やえんどう を栽培しない こと。	普	I
			オモダカ								
			キシュウス <sup>メ</sup> ノヒエ								
			クロゲワイ								
			コウキカ <sup>ラ</sup>								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダ <sup>カ</sup>								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミス <sup>ガ</sup> ヤツリ											
一年生雑草											
カチホ <sup>シ</sup> フロアブル	イ <sup>フ</sup> フェンカルハ ゾン・テフリトリ オン・ヘ <sup>ン</sup> スルフロ ンメチル水和剤	移植 水稻	アミド <sup>ロ</sup> ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～ヒ <sup>レ</sup> I2.5 葉期但し、 移植後30 日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人ヘリ コプターに よる滴下		無人ヘリコプター による滴下 のみとする。	普	I
			ウリカワ								
			オモダカ								
			クロゲワイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミス <sup>ガ</sup> ヤツリ								
			水田一年生雑草								
ガ <sup>ツ</sup> ントZ200FG	テフリトリオン・ プロ <sup>ビ</sup> リスルフロ ン粒剤	移植 水稻	アミド <sup>ロ</sup> ・藻類によ る表層はく離	200g/ 10a	移植後3日 ～ヒ <sup>レ</sup> I3葉 期 ただ し、移植 後30日ま で	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			ウリカワ								
			オモダカ								
			クロゲワイ								
			コウキカ <sup>ラ</sup>								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダ <sup>カ</sup>								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミス <sup>ガ</sup> ヤツリ											
一年生雑草											
ガ <sup>ツ</sup> ントZフロアブル	テフリトリオン・ プロ <sup>ビ</sup> リスルフロ ン水和剤	移植 水稻	アミド <sup>ロ</sup> ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	移植後3日 ～ヒ <sup>レ</sup> I3葉 期 ただ し、移植 後30日ま で	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
			ウリカワ								
			オモダカ								
			クロゲワイ								
			コウキカ <sup>ラ</sup>								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダ <sup>カ</sup>								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミス <sup>ガ</sup> ヤツリ											
一年生雑草											

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性											
キマリテフロアブル	イフフェンカルハ ゾンテフリトリ オン水和剤	移植 水稲	アミト <sup>®</sup> ロ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～ヒ <sup>®</sup> E3葉 期但し、 移植後30 日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人ヘ リコプター による滴下		無人ヘリコプター による滴下 のみとする。	普	I											
			ウリカワ																			
			オモダカ																			
			クログワイ																			
			シスイ																			
			セリ																			
			ヒルムシロ																			
			ヘラオモダカ																			
			ホタルイ																			
			マツハイ																			
			ミスガヤツリ																			
			水田一年生雑草																			
クサハルカンフロアブル	ヒラクロニル・ヒ ラゾレート・ベン ゾヒシクロン水 和剤	移植 水稲	ウリカワ	500mL /10a	移植直後 ～ヒ <sup>®</sup> E2.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I											
			オモダカ																			
			クログワイ																			
			ヒルムシロ																			
			ヘラオモダカ																			
			ホタルイ																			
			マツハイ																			
			ミスガヤツリ																			
			一年生雑草																			
			クサメツルフロアブル									テニクロール・ヘ ンスルフロンメチ ル水和剤	移植 水稲	アミト <sup>®</sup> ロ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	移植後5日 ～ヒ <sup>®</sup> E2葉 期 ただ し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人ヘ リコプター による滴下	砂壤 土	無人ヘリコプター による滴下 のみとする。	普	I
														ウリカワ								
														オモダカ								
クログワイ																						
セリ																						
ヒルムシロ																						
ホタルイ																						
マツハイ																						
ミスガヤツリ																						
水田一年生雑草																						
アミト <sup>®</sup> ロ・藻類によ る表層はく離	移植直後 ～ヒ <sup>®</sup> E2葉 期 ただ し、移植後 30日まで	壤土 ～埴 土																				
ウリカワ																						
オモダカ																						
クログワイ																						
セリ																						
ヒルムシロ																						
ホタルイ																						
マツハイ																						
ミスガヤツリ																						
水田一年生雑草																						
ゲハートエア <sup>®</sup> 粒 剤				ダイムロン・ヒラ クロニル・ベンゾ ヒシクロン・メ タゾスルフロ ン粒剤	移植 水稲	一年生雑草及び多 年生広葉雑草	400g/ 10a	移植後14 日～ヒ <sup>®</sup> E4 葉期ただ し、収穫60 日前まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布				無人航空機 による散布 のみとする。		普		I				



## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
サスケ粒剤200	カフェンストール・シクロスファミロン・タムロン・ペンゾピシロン粒剤	移植 水稻	アミド・ロ・藻類による表層はく離	200g/ 10a	移植後3日～ トイ2葉期ただし、 移植後30日まで	1回	水口施用、湛水 散布又は無人航空 機による散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
サラレット <sup>®</sup> KAI400FG	イマゾスルフロ ン・オキサジクロメ ン・ピラクロニル 粒剤	移植 水稻	ウリカ	400g/ 10a	移植直後 ～トイ2.5 葉期但し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
			サラレット <sup>®</sup> KAIフ ロアブル								
ウリカ											
オモダカ											
クログワイ											
コウキカラ											
セリ											
ヒルムシロ											
ホタルイ											
マツハイ											
ミスガヤツリ											
水田一年生雑草											
ジエイソルフロアブ ル	シクロピリメ ト・ピラゾレ ト・フェントラミ ト水和剤	移植 水稻	アミド・ロ・藻類による表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～トイ2.5 葉期た だし、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
			ウリカ								
			エゾノサヤカグサ								
			オモダカ								
			シスイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ジェイフレンド 400FG	オキサジクロリン・テフリルトリオン・ピラクロニル 粒剤	移植 水稻	ウリカワ	400g/ 10a	移植後5日 ～レ <sup>レ</sup> I3葉 期 ただ し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			オモダカ								
			クダマ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
ジェンタムMX豆 つぶ250	ピリフタリド・ ピリミルファン・ メトリアン剤	移植 水稻	一年生雑草	250g/ 10a	移植後3日 ～レ <sup>レ</sup> I3.5 葉期ただ し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			多年生広葉雑草								
ゼータタイガー 300FG	プロピリスルホン・プロモチド・ヘンチキサゾン粒剤	移植 水稻	アミド・ロ・藻類による表層はく離	300g/ 10a	移植後3日 ～レ <sup>レ</sup> I3葉 期ただし、 移植後30 日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			イソノキサカサ								
			一年生雑草								
			多年生広葉雑草								
ゼータタイガーフロアブル	プロピリスルホン・プロモチド・ヘンチキサゾン水和剤	移植 水稻	アミド・ロ・藻類による表層はく離	500mL /10a	移植後3日 ～レ <sup>レ</sup> I3葉 期ただし、 移植後30 日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ウリカワ								
			イソノキサカサ								
			オモダカ								
			クダマ								
			コウキカウ								
			シズイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
ツルキ 250粒剤	イソフェンカルハゾン・イマゾスルフロクサゾン・ピシクロン粒剤	移植 水稻	一年生雑草	250g/ 10a	移植直後 ～レ <sup>レ</sup> I2.5 葉期但し、 移植後30 日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又は 無人航 空機によ る散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			多年生広葉雑草								
ツルキフロアブル	イソフェンカルハゾン・イマゾスルフロクサゾン・ピシクロン水和剤	移植 水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	500mL /10a	移植直後 ～レ <sup>レ</sup> I2.5 葉期 但 し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ディオーレーア-粒剤	オキサジクロメソン・テフリルトリオン・メタゾスルフロンの粒剤	移植 水稻	ウリカワ	400g/ 10a	移植後3日 ～レ <sup>1</sup> E3葉 期ただし、 移植後30 日まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカハラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
トップガンL250 グラム	ピリミノバクメチル・プロモフチド・ヘンズルフロシメチル・ヘンチキサゾンの剤	移植 水稻	アミド・藻類による表層はく離	250g/ 10a	移植直後 ～レ <sup>1</sup> E2.5 葉期 但 し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 ヘリコプター による散 布	砂壤 土～ 埴土	無人ヘリコプター による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカワ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
パッチリ400FG	イマゾスルフロシメチル・プロモフチドの剤	移植 水稻	アミド・藻類による表層はく離	400g/ 10a	移植直後 ～レ <sup>1</sup> E2.5 葉期た だし、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカワ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカハラ								
			シスイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
マツハイ											
ミスガヤツリ											
水田一年生雑草											
パッチリLX400FG	イマゾスルフロシメチル・オキサジクロメソン・ピラクロニル・プロモフチドの剤	移植 水稻	一年生雑草	400g/ 10a	移植直後 ～レ <sup>1</sup> E2.5 葉期た だし、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			多年生広葉雑草								
パッチリLXフロアブル	イマゾスルフロシメチル・オキサジクロメソン・ピラクロニル・プロモフチド水和剤	移植 水稻	ウリカワ	500mL /10a	移植直後 ～レ <sup>1</sup> E2.5 葉期 た だし、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			エゾノサヤヌカガサ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカハラ								
			シスイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
マツハイ											
ミスガヤツリ											
水田一年生雑草											

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ヒエクリン豆つぶ250	ピリミダゾール系除草剤	移植 水稻	ヒエ	250g/ 10a	移植後15日～ヒエI4葉期 但し、収穫45日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人ヘリコプターによる散布		無人ヘリコプターによる散布のみとする。	普	I
ピクトリ-Z400FG	ピラコニル・フロピリスルホン系粒剤	移植 水稻	アミド・ロ・藻類による表層はく離 一年生雑草 多年生広葉雑草	400g/ 10a	移植後5日～ヒエI3葉期 ただし、収穫60日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
ピクトリ-Z700アール	ピラコニル・フロピリスルホン系水和剤	移植 水稻	アミド・ロ・藻類による表層はく離 ウリカ エゾノサヤカガサ オモダカ クダマ コウキカ シイ セリ ヒルムシロ ハラモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草	500mL/ 10a	移植後5日～ヒエI3葉期 ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下		無人ヘリコプターによる滴下のみとする。	普	I
フルバワー-MX500ゲラムFG	ピラコニル・フルセトスルホン・メトリアン系粒剤	移植 水稻	アミド・ロ・藻類による表層はく離 エゾノサヤカガサ 一年生雑草 多年生広葉雑草	500g/ 10a	移植後5日～ヒエI3.5葉期 但し、収穫60日前まで	1回	湛水散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
ペンケイ豆つぶ250	ピリミダゾール系フェノキシ酢酸系除草剤	移植 水稻	アミド・ロ・藻類による表層はく離 一年生雑草 多年生広葉雑草	250g/ 10a	移植後3日～ヒエI3葉期 但し、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
ホットコンビ 200粒剤	ピラコニル・フロピリスルホン系粒剤	移植 水稻	ヒルムシロ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草	200g/ 10a	移植直後～ヒエI2葉期 ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ホットコンピフロアブル	テニクロール・ベンゾピシクロン水和剤	移植 水稻	ヒルムシロ	300mL /10a	植代後～ 移植前7日 または移 植直後～/ ビエ1.5葉 期 ただ し、移植後 30日まで	2回以 内	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
			ヒルムシロ	500mL /10a	移植直後 ～ビエ2葉 期 ただ し、移植後 30日まで						
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ホテ-ガードフロアブル	テフリトリオン・フェントラサミト水和剤	移植 水稻	ウリカワ	500mL /10a	移植後5日 ～ビエ3葉 期 ただ し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布又は 水口施用 又は無人 ヘリコプ ターによ る滴下		無人ヘリコプター による滴下 のみとす る。	普	I
			エゾノサヤヌカゲサ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキヤガラ								
			シスイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
水田一年生雑草											
ホテ-ガードフロアブル	テフリトリオン・リアアフェン水和剤	移植 水稻	ウリカワ	500mL /10a	移植後5日 ～ビエ3.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。※薬害 を生じるお それがある ので、後作 物としてな す、たまね ぎおよびさ やえんどう を栽培しな いこと。	普	I
			オモダカ								
			キシュウスメンヒエ								
			クログワイ								
			コウキヤガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ホテ-ガード豆つぶ250	テフリトリオン・フェントラサミト剤	移植 水稻	アミドロ・藻類による表層はく離	250g/ 10a	移植後5日 ～ビエ2.5 葉期 但 し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 ヘリコプ ターによ る散布		無人ヘリコプター による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカワ								
			エゾノサヤヌカゲサ								
			オモダカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
カセータ400FG	ピラコニル・プロピリスルフロ ン粒剤	移植 水稻	アミドロ・藻類による表層はく離	400g/ 10a	移植後5日 ～レ <sup>1</sup> 3葉 期ただし、 収穫60日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			多年生広葉雑草								
レラスエー粒剤	ジメトリン・ ダムロン・テフ リルトリオン・メ タゾスルフロ ン粒剤	移植 水稻	一年生雑草及び多 年生広葉雑草	400g/ 10a	移植後14 日～レ <sup>1</sup> 4 葉期ただし、 収穫60 日前まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
月光フロアブル	カフェンストール・ ダムロン・メ タゾスルフロ ン水和剤	移植 水稻	ウリカ	500mL /10a	移植後3日 ～レ <sup>1</sup> 3葉 期ただし、 移植後30 日まで	1回	原液湛水 散布又は 無人ヘリ コプター による滴 下		無人ヘリコプ ターによる滴 下のみとする。	普	I
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキガラ								
			シスイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
水田一年生雑草											
天空エー粒剤	フェントラザミ ド・ベンゾヒ シクロン・メ タゾスルフロ ン粒剤	移植 水稻	一年生雑草	300g/ 10a	移植後1日 ～レ <sup>1</sup> 3葉 期ただし 移植後30 日まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			多年生広葉雑草								
天空フロアブル	フェントラザミ ド・ベンゾヒ シクロン・メ タゾスルフロ ン水和剤	移植 水稻	一年生雑草及び多 年生広葉雑草	500mL /10a	移植直後 ～レ <sup>1</sup> 3葉 期 だ だし、移植 後30日 まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
流星エー粒剤	フェンキトリオン・ ペンキザン・ メタゾスルフロ ン粒剤	移植 水稻	ウリカ	400g/ 10a	移植後3日 ～レ <sup>1</sup> 3葉 期ただし、 移植後30 日まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
アットウZフロアブル	テフルトリオン・ ピラコニル・ プロピリスルフロ ン水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ レ <sup>1</sup> 3葉期 ただし、収 穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
アパレZ400FG	ピラクロニル・フロピリスルフロ・プロモフチド粒剤	直播水稲	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ バエ3葉期 ただし、収穫 90日前まで	1回	湛水散布、湛水 周縁散布 又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
アトリ豆つぶ250	ピリスルファン剤	直播水稲	ホメダカ クログワイ	250g/ 10a	稲5葉期～ 収穫45日 前まで	1回	湛水散布 又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
イネキングプロアブル	ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾピシクロン水和剤	直播水稲	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ バエ2.5葉 期 ただし、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航空機による 滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ 一年生雑草								
ウイナールプロアブル	イソフェンカルハゾン・プロモフチド・ベンスルフロメチル水和剤	直播水稲	アミド・ロ・藻類による表層はく離	500mL /10a	稲1葉期～ バエ2.5葉 期 但し、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人ヘリコプターによる 滴下		無人ヘリコプターによる滴下のみとする。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
ミスガヤツリ 水田一年生雑草											
ウイニングランプロアブル	イソフェンカルハゾン・プロモフチド・ベンスルフロメチル水和剤	直播水稲	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ バエ2.5葉 期 但し、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空機による 滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
マツハイ											
ミスガヤツリ 一年生雑草											
エーワンプロアブル	オキサジクロメソン・テフリルトリオン水和剤	直播水稲	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ バエ3葉期 但し、収穫 90日前まで	1回	原液湛水 散布又は 水口施用 又は無人ヘリコプターによる 滴下	砂壌土～ 埴土	無人ヘリコプターによる滴下のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ 水田一年生雑草											
カウンスルコンプリートプロアブル	テフリルトリオン・トリアファモン水和剤	直播水稲	ウリカ	500mL /10a	は種直後 ～バエ3.5 葉期 だ だし、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航空機による 滴下		無人航空機による滴下のみとする。※薬害を生じるおそれがある	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ 一年生雑草								
ガホシルプロアブル	イソフェンカルハゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロメチル水和剤	直播水稲	アミド・ロ・藻類による表層はく離	500mL /10a	稲1葉期～ バエ2.5葉 期 但し、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人ヘリコプターによる 滴下		無人ヘリコプターによる滴下のみとする。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
マツハイ											
ミスガヤツリ 水田一年生雑草											

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
ガツツZ200FG	テフルトリオン・ プロピリスルホン 粒剤	直播 水稻	アミド・ロ・藻類によ る表層はく離	200g/ 10a	稲1葉期～ /ビ <sup>1</sup> E3葉期 ただし、 収穫60日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
ガツツZ700アブル	テフルトリオン・ プロピリスルホン 水和剤	直播 水稻	アミド・ロ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	稲1葉期～ /ビ <sup>1</sup> E3葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
キマリテフロアブル	イソフェンカルハ ゾン・テフルトリ オン水和剤	直播 水稻	アミド・ロ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	稲1葉期～ /ビ <sup>1</sup> E3葉期 但し、収穫 90日前ま で	1回	原液湛水 散布又は 無人ヘリ コプター による滴 下		無人ヘリコ プターに よる滴下 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
水田一年生雑草											
クサハルカンフロアブル	ヒラクロニル・ヒ ラゾレート・ベン ゾビシクロン水 和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ /ビ <sup>1</sup> E2.5葉 期 ただ し、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
ゲハート <sup>®</sup> エア <sup>®</sup> 粒 剤	タムロン・ヒラ クロニル・ベン ゾビシクロン・メ タゾスルホン粒 剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビ <sup>1</sup> E4葉期 ただし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
サスケ粒剤200	カフェンストール シクロスファミ ン・タムロン・ ベンゾビシクロ ン粒剤	直播 水稻	ウリカ	200g/ 10a	稲1葉期～ /ビ <sup>1</sup> E2葉期 ただし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
サフレット <sup>®</sup> KAI400FG	イマゾスルホン オキサジクロメ ン・ヒラクロニ ル粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビ <sup>1</sup> E2.5葉 期 但し、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											



◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
サラレット <sup>®</sup> KAIフロアブル	イマゾスルホン・オキサジクロホロン・ヒラクロニル水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ /ビ <sup>®</sup> E2.5葉 期 ただし、 収穫 90日前ま で	1回	原液湛水 散布又は 無人ヘリ コプター による 滴下		無人ヘリコプター による滴下 のみとする。	普	I
			セリ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
水田一年生雑草											
ジエイソルフロアブル	シクロピリモレート・ヒラゾレート・フェントラザミト水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ /ビ <sup>®</sup> E2.5葉 期ただし、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
			ヒルムシロ								
			ハラモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											
ジエイフレント <sup>®</sup> 400FG	オキサジクロホロン・テフリルトリオン・ヒラクロニル粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビ <sup>®</sup> E2.5葉 期 ただし、 収穫60日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											
ジヤンダ <sup>®</sup> ルムMX豆つぶ250	ヒラゾレート・ヒラミルファンメトリオン剤	直播 水稻	ウリカ	250g/ 10a	稲1葉期～ /ビ <sup>®</sup> E3.5葉 期ただし、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											
ゼータタイガ- <sup>®</sup> 300FG	プロピリスルホン・プロモチド・ヘントキサゾン粒剤	直播 水稻	アミド・ロ・藻類による表層はく離	300g/ 10a	稲1葉期～ /ビ <sup>®</sup> E3葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
マツハイ											
ミスガヤツリ											
一年生雑草											
ゼータタイガ- <sup>®</sup> フロアブル	プロピリスルホン・プロモチド・ヘントキサゾン水和剤	直播 水稻	アミド・ロ・藻類による表層はく離	500mL /10a	稲1葉期～ /ビ <sup>®</sup> E3葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
マツハイ											
ミスガヤツリ											
水田一年生雑草											
ツルキ <sup>®</sup> 250粒剤	イソフェンカルハゾン・イマゾスルホン・ベンゾピシクロニル水和剤	直播 水稻	ウリカ	250g/ 10a	稲1葉期～ /ビ <sup>®</sup> E2.5葉 期但し、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布又は 無人航空 機による 散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											
ツルキ <sup>®</sup> フロアブル	イソフェンカルハゾン・イマゾスルホン・ベンゾピシクロニル水和剤	直播 水稻	ウリカ	500m L /10a	稲1葉期～ /ビ <sup>®</sup> E2.5葉 期 但し、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下			普	I
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
デイオレア-粒剤	オキサジクロメリン・テフリルトリオン・メタゾスルフロンの粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビ <sup>1</sup> E3葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
トップガンL250 グラム	ピリミノバクメチル・プロモフチド・ベンズスルフロンのメチル・ヘンチキサゾンの剤	直播 水稻	アミト・ロ・藻類によ る表層はく離	250g/ 10a	稲1葉期～ /ビ <sup>1</sup> E2.5葉 期 但し、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 ヘリコプ ターによ る散 布	砂壤土～ 埴土	無人ヘリコプ ターによ る散 布の みとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
パッチリ400FG	イマゾスルフロンのピラクロニル・プロモフチドの粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビ <sup>1</sup> E2.5葉 期ただし、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散 布		無人航空機 による散 布の みとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
水田一年生雑草											
パッチリLX400FG	イマゾスルフロンのオキサジクロメリン・ピラクロニル・プロモフチドの粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビ <sup>1</sup> E2.5葉 期ただし、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散 布		無人航空機 による散 布の みとす る。	普	I
			セリ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
パッチリLXフロアブル	イマゾスルフロンのオキサジクロメリン・ピラクロニル・プロモフチドの水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ /ビ <sup>1</sup> E2.5葉 期 ただ し、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
ヒエクリン豆つぶ 250	ピリミノバクメチル剤	直播 水稻	/ビ <sup>1</sup> E	250g/ 10a	稲3葉期～ /ビ <sup>1</sup> E3葉期 但し、収穫 45日前ま で	1回	湛水散 布又は無 人ヘリコ プターに よる散 布		無人ヘリコプ ターによ る散 布の みとす る。	普	I
ピクトリ-Z400FG	ピラクロニル・プロピリスルフロンの粒剤	直播 水稻	アミト・ロ・藻類によ る表層はく離	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビ <sup>1</sup> E3葉期 ただし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散 布		無人航空機 による散 布の みとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ピクトリ-Zフロアブル	ピラクロニル・プロピリスルフロンの水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ /ビ <sup>1</sup> E3葉期 ただし、収 穫60日前 まで	1回	原液湛水 散布又は 無人ヘリ コプター による 滴下		無人ヘリコプ ターによ る滴下 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
フルバ <sup>®</sup> ワ-MX500 グ <sup>®</sup> ラムFG	ピ <sup>®</sup> ラクロニル・フル セトスルフロン・メ トリオン粒剤	直播 水稻	ウリカ	500g/ 10a	稲1葉期～ バ <sup>®</sup> E3.5葉 期但し収 穫60日前 まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミス <sup>®</sup> ガヤツリ								
ペンケイ豆つぶ 250	ピ <sup>®</sup> リミスルファン フェノキサリホ ン剤	直播 水稻	アミド <sup>®</sup> ロ・藻類によ る表層はく離	250g/ 10a	稲1葉期～ バ <sup>®</sup> E3葉期 但し、収穫 90日前ま で	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			ミス <sup>®</sup> ガヤツリ								
ホ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> ガ <sup>®</sup> ート <sup>®</sup> フ ア <sup>®</sup> ブル	テ <sup>®</sup> フリルトリオン・ フェントラザ <sup>®</sup> ミ ト水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ バ <sup>®</sup> E3葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	原液湛水 散布又は 無人ヘリ コプター による滴 下		無人ヘリコ プター による滴下 のみとす る。	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミス <sup>®</sup> ガヤツリ								
			水田一年生雑草								
ホ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> ガ <sup>®</sup> ート <sup>®</sup> フ ロ <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ブル	テ <sup>®</sup> フリルトリオン・ト リア <sup>®</sup> ファモン水和 剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	は種直後 ～バ <sup>®</sup> E3.5 葉期 ただ し、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。※薬害 を生じるお それがある ので、後作 物としてな す、たまね ぎおよびさ やえんどう を栽培しな いこと	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミス <sup>®</sup> ガヤツリ								
			一年生雑草								
カ <sup>®</sup> ゼ <sup>®</sup> -タ400FG	ピ <sup>®</sup> ラクロニル・フ ロ <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> リスルフロン 粒剤	直播 水稻	アミド <sup>®</sup> ロ・藻類によ る表層はく離	400g/ 10a	稲1葉期～ バ <sup>®</sup> E3葉期 ただし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			ミス <sup>®</sup> ガヤツリ								
レ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> -粒 剤	ジ <sup>®</sup> メタ <sup>®</sup> トリオン・ タ <sup>®</sup> イムロン・テ <sup>®</sup> フ リルトリオン・メ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> スルフロン粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ バ <sup>®</sup> E4葉期 ただし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミス <sup>®</sup> ガヤツリ								
天 <sup>®</sup> 空 <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> -粒 剤	フェ <sup>®</sup> ントラザ <sup>®</sup> ミ ト <sup>®</sup> ・ベン <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> ピ シクロ <sup>®</sup> ・メ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ズ スルフロン粒剤	直播 水稻	ウリカ	300g/ 10a	稲1葉期～ バ <sup>®</sup> E3葉期 ただし収 穫90日前 まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミス <sup>®</sup> ガヤツリ								
一年生雑草											

## ◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
天空アアブル	フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ バ <sup>1</sup> E3葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ 一年生雑草								
流星アア粒剤	フェキナトリオン・ ペントキサゾン・ メタゾスルフロン 粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ バ <sup>1</sup> E3葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ 一年生雑草								

(3) 麦類・大豆・小豆・野菜 (殺菌・殺虫剤)

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
シルバキアフロアブル	テブコナゾール水和剤	大麦	うどんこ病	16倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
		小麦			収穫7日前まで				
		大麦	赤かび病		収穫14日前まで				
		小麦			収穫7日前まで				
フルト乳剤25	プロピコナゾール乳剤	大麦	赤かび病	8倍	収穫21日前まで	1回	無人航空機による散布	普	I
		小麦			収穫7日前まで	3回以内			
トップジンMゾル	チオファネートメチル水和剤	小麦	赤かび病	8倍	収穫14日前まで	3回以内(出穂期以降は2回以内)	無人航空機による散布	普	I
		麦類(小麦)			収穫21日前まで				
ワークアップフロアブル	メコナゾール水和剤	麦類	うどんこ病	10~16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
			赤かび病	10~24倍					
			赤さび病	10~16倍					
スミチオン乳剤	MEP乳剤	小麦	アブラムシ類	8倍	収穫7日前まで	1回	無人航空機による散布	普	I
		大麦							
アミスター20フロアブル	アジキストロビン水和剤	だいず	紫斑病	16~24倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
トップジンMゾル	チオファネートメチル水和剤	だいず	紫斑病	5倍	収穫14日前まで	4回以内	無人航空機による散布	普	I
ベルコートフロアブル	ミノクタジンアルベシル酸塩水和剤	だいず	紫斑病	12倍	収穫7日前まで	4回以内	無人航空機による散布	普	I
				6倍					
MR. ショーカーEW	シラルオフェン乳剤	だいず	カメムシ類	16倍	収穫14日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
			ハスモンヨトウ						
スターケルメイト液剤10	ジノテフラン液剤	だいず	カメムシ類	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
			タイス・サヤマハエ						
スターケル液剤10	ジノテフラン液剤	だいず	カメムシ類	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
			タイス・サヤマハエ						
スミチオン乳剤	エトフェンプロックス・MEP乳剤	だいず	カメムシ類	8倍	収穫21日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
スミチオン乳剤	MEP乳剤	だいず	ウコンノメイガ	8倍	収穫21日前まで	4回以内	無人航空機による散布	普	I
			カメムシ類						
			シロイモシ・マタラメイガ						
			タイス・サヤマハエ						
			タイス・サヤマシガ						
			マメシクイガ						
トロボンエア	エトフェンプロックス乳剤	だいず	カメムシ類	8倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
			ハスモンヨトウ						
			マメシクイガ						

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は令和4年1月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性	
トレボンスカイMC	イトフェンプロックス マイクロカプセル剤	だいち	カメシ類	8~16倍	収穫14日 前まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I	
			ハスモンヨトウ							
			マメシクイガ	16倍						
				8倍						
ノモルト乳剤	テラベンスロン 乳剤	だいち	ハスモンヨトウ	8~16倍	収穫14日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布	普	I	
プロレオフロアブル	ビリタリル水和 剤	だいち	ハスモンヨトウ	8~16倍	収穫7日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布	普	I	
プロレソフロアブル5	クロラントラニリフ ロール水和剤	だいち	ウコンメカ	16~32倍	収穫7日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布	普	I	
			オオタバコガ							
			ハスモンヨトウ							
			マメシクイガ							
ベカサフロアブル	フルベンジアミド 水和剤	だいち	ハスモンヨトウ	16~32倍	収穫7日 前まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I	
マトリックフロアブル	クロマフェノジト 水和剤	だいち	ハスモンヨトウ	8~16倍	収穫前日 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I	
ロムタソエアー	テプフェノジト 水和剤	だいち	ハスモンヨトウ	16倍	収穫14日 前まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I	
アミスタートレボンSE	イトフェンプロッ クス・アゾキシスト ロピン水和剤	だいち	カメシ類	8倍	収穫21日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布	普	I	
			マメシクイガ							
			紫斑病							
ファンタジスタフロアブル	ビリベシカル 水和剤	だいち	紫斑病	16倍	収穫7日 前まで	3回以内	無人航空機 による散布			
トレボンエアー	イトフェンプロッ クス乳剤	あずき	アスキメカ	8倍	収穫14日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布	普	I	
ジヤストフィットフロアブル	フルベコリト・ ベンチアパリカル ブイソロピル 水和剤	たまねぎ	べと病	24倍	収穫7日 前まで	3回以内	無人航空機 による散布	普	I	
オルトラン水和剤	アセフェート水和 剤	たまねぎ	ネギアザミウマ	16倍	収穫21日 前まで	5回以内	無人航空機 による散布	普	I	