

適期の防除と実肥施用で品質・収量確保！

1. 気象および大麦の生育状況

2月は気温が高く推移したことから、生育は早まりましたが、その後、2月下旬～3月中旬にかけて気温が低く推移したため、出穂期は平年並～やや早くなることが見込まれます。




図 麦作期間の気温の経過

2. 品質・収量確保に向けた管理

適期防除と必要に応じた実肥を施用しましょう。

(1) 赤かび病防除

大麦は赤かび病に弱いため、必ず2回防除を行いましょう。1回目は開花始め、2回目は1回目の1週間後です。気温の経過により、出穂期～開花期の日数は変化しますが、以下の目安を参考に防除の準備を進めましょう。

【防除適期の目安】

播種時期	出穂期の予想	1回目の防除 (開花始め)	2回目の防除 (1回目の1週間後)
10月下旬	4月12日前後	4月 17～22 日	4月 24 日～29 日

※今後の気象状況によって、出穂時期は前後することがあります。

以下を参考に場ごとに防除適期を判断しましょう。

(参考)大麦の生育予測

出穂約2週間前	出穂約1週間前	出穂期
		40～50%の茎から 穂先が出ている状態
		開花始め
		出穂5～10日後 (気温によって大きく変動)

(2) 実肥施用

実肥は収量増加やタンパク質含有率向上に効果があります。特に、麦茶用は高タンパクの大麦が求められます。ただし、施用量や施用時期、生育状況によっては倒伏や遅れ穂の発生を助長しますので、ほ場ごとに判断して施用しましょう。

【施用量(窒素成分)および施用時期の目安】

施肥体系・生育状況	施用量	施用時期
分施体系	4kg/10a	
実肥成分を含まない一発肥料		出穂 10 日後
実肥成分を含む一発肥料 (大麦専用一発肥料 MFS 等)	1~2kg/10a	
特に、茎数が多く、葉色が淡い場合	2kg/10a	出穂1週間前～ 出穂 10 日後
特に、茎数が少なく、葉色が濃い場合 (播種時期が遅いほ場など)		施用しない

(3) 排水対策

今作期中は降水量が平年並～やや多くなっており、3月には湿害のほ場が目立ってきてています。

溝のくずれがないか、戻水戸からスムーズに排水されているか確認して、排水促進に努めましょう。

