

愛玩鶏を含む家きん飼養者の皆様へ

高病原性鳥インフルエンザ (HPAI) 発生リスクが高まっています！！

- ◇ ウイルスを一定量以下まで減らすことで感染を防ぐことができます。
- ◇ 家きんのお世話の際には、HPAI ウイルスを持ち込まないように、ご自身や鶏舎周辺の消毒を行いましょう。


HPAI に有効な消毒薬

手指、ケージ等の消毒	広い面積の散布消毒	地面などの消毒
市販のハンドスプレー 	蓄圧式噴霧器 	消石灰 ✓ 塩素系消毒薬と混入すると効果を打ち消すので併用しないこと。 ✓ 散布時には手袋、マスク、ゴーグル着用のこと。 
✓ エタノール、逆性石けん（塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）、塩素系消毒薬等（次亜塩素酸ナトリウム液（ハイターなど））、多くの消毒薬がHPAI ウイルスに有効です。 ✓ 市販の消毒薬は記載通りに水で希釈し用います。 ✓ 汚れがあると消毒効果が薄まるので汚れを落としてから消毒します。		

いずれもホームセンターなどで購入可能です

養鶏農家で行われている消石灰散布「待ち受け消毒」

衛生管理区域と鶏舎の周辺に 0.5～1 kg／1 m²の濃度で1 m幅の散布



- ✓ 消石灰帯を通過したものに付着したウイルスを不活化
- ✓ 消石灰帯に落下したウイルスを不活化
- ✓ 野生動物の忌避効果
- ✓ 雪上の散布でも効果を発揮

※ 雨に濡れて乾くと消毒効果がなくなるので撒きなおす必要があります。

<参考：家きんとは？>

鶏（烏骨鶏も鶏です）

あひる（マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む）

うずら（ヨーロツパウズラを含む）

きじ（ヤマドリを含む）

だちょう（エミューを含む）

ほろほろ鳥

七面鳥

滋賀県