

(8) その他薬剤

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚毒性
カルパ <sup>®</sup> -粉粒剤16	過酸化カルシウム粉粒剤		乾燥種粒重量の等倍～2倍量	は種前浸種後	1回	湿粉衣(地上は種用、空中散播及び無人ヘリコプターによる散播用)	普	I
タチカ <sup>®</sup> レエ-スM液剤	ヒド <sup>®</sup> ロキシソキサゾール・メタラキシルM液剤	ムシ苗防止	1000倍	は種時	1回	土壌灌注	普	I
			500～1000倍	は種時又は発芽後				
		移植時の活着促進	1000倍	は種時				
			500～1000倍	は種時又は発芽後				
		根の生育促進	1000倍	は種時				
			500～1000倍	は種時又は発芽後				
タチカ <sup>®</sup> レエ-スM粉剤	ヒド <sup>®</sup> ロキシソキサゾール・メタラキシルM粉剤	ムシ苗防止	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 <sup>kg</sup> )1箱当り6～8g	は種前	1回	育苗箱土壌に均一に混和	普	I
		根の生育促進						
ナエフィンフロアブル	ヒ <sup>®</sup> カルブトゾックス水和剤		1000～2000倍	は種時から緑化期	2回以内	土壌灌注	普	I
			2000倍	は種時				
ナエフィン粉剤	ヒ <sup>®</sup> カルブトゾックス粉剤		育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5 <sup>kg</sup> )1箱当り6～8g	は種前	1回	育苗箱土壌に均一に混和する。	普	I
レンテミン液剤	シタケ菌糸体抽出物液剤	根部生育促進	1000倍	催芽前	-	48時間種子浸漬	普	I
			500倍	出芽揃期～移植5日前		灌注		