

3. 無人航空機 (無人ヘリコプター等)

(1) 水稻 (殺菌・殺虫剤)

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病虫害 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
ポリライト250G	メトミストロピン剤	いもち病	250g/10 a	出穂10日前 まで ただ し、収穫45 日前まで	1回	無人航空機に よる散布	普	I
		稲こうじ病						
		白葉枯病						
		穂枯れ(ご ま葉枯病 菌)						
		墨黒穂病						
		紋枯病						
カスミンパリタ [®] シン液剤	カスカ [®] マイシン・パ リタ [®] マイシン液剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		紋枯病						
カスミン液剤	カスカ [®] マイシン液剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
タ [®] フルカットフロア [®] フル	カスカ [®] マイシン・トリシ クラ [®] ール水和剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		穂枯れ(ご ま葉枯病 菌)						
トライフロア [®] フル	テ [®] フロキン水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		稲こうじ病						
		穂枯れ(ご ま葉枯病 菌)						
ノン [®] ラスフロア [®] フル	トリシクラ [®] ール・フェ リム [®] ゴン水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人ヘリコプ ター による散布	普	I
パ [®] シタック [®] フル	メ [®] ロル水和剤	紋枯病	6~8倍	収穫14日前 まで	3回以内	無人ヘリコプ ター による散布	普	I
パ [®] リタ [®] シンエア	パ [®] リタ [®] マイシン液剤	紋枯病	8倍	収穫14日前 まで	5回以内	無人ヘリコプ ター による散布	普	I

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
ビームイトゾル	トリシクラゾール水和剤	いもち病	5～8倍	収穫7日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
ビームゾル	トリシクラゾール水和剤	いもち病	6～8倍	収穫7日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	劇	I
ブワン乳剤	イソプロチオラン乳剤	いもち病 稲こうじ病	8倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
ブラシゾル	フェリムゾン・フサイド水和剤	いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
ブラシフロアブル	フェリムゾン・フサイド水和剤	いもち病 ごま葉枯病 もみ枯細菌病 稲こうじ病 褐条病 内穎褐変病 変色米(アルタリア菌) 変色米(ヒコカム菌) 変色米(カーリア菌) 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 墨黒穂病	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
モンカットフロアブル	フルタニル水和剤	紋枯病	8倍	収穫14日前 まで	4回以内	無人航空機に よる散布	普	I
モンカットラフ サイト [®] 20フ ロアブル	フサライド [®] ・フルタニル 水和剤	いもち病 紋枯病	6~8倍	収穫14日前 まで	3回以内	無人航空機に よる散布	普	I
モンセレンフロアブル	ヘンシクロン水和剤	紋枯病	8~10倍	収穫21日前 まで	4回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
ラフ サイト [®] ハリタ [®] フロア ブル	ハリタ [®] マイシン・フサ イト [®] 水和剤	いもち病 紋枯病	8倍	収穫14日前 まで	3回以内	無人航空機に よる散布	普	I
ラフ サイト [®] フロアブル	フサライド [®] 水和剤	いもち病	5~8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
エクシート [®] フロアブル	スルホキサフロル水和 剤	ウカ類 カメシ類 ツマグ [®] ロヨコハ [®] イ	16倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機に よる散布	普	I
エミリアフロアブル	フルビ [®] リミン水和剤	イト [®] ロオイムシ ウカ類 カメシ類 ツマグ [®] ロヨコハ [®] イ	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
オーケストラフロアブル	ヘンズ [®] ヒ [®] リモキサン 水和剤	ウカ類幼虫 ツマグ [®] ロヨコハ [®] イ 幼虫	16倍 8倍 16倍 8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機に よる散布	普	I

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
キラップ フロアブル	エチフ ロール水和剤	イネト オイムシ	16倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類	8~16倍					
		カメムシ類						
スターカメイト液剤10	ジノテフラン液剤	ウカ類	16倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機に よる散布	普	I
			30倍					
			8倍					
		カメムシ類						
		ツマク ロヨコハイ	16倍					
スターカ液剤10	ジノテフラン液剤	ウカ類	16倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機に よる散布	普	I
			30倍					
			8倍					
		カメムシ類						
		ツマク ロヨコハイ	16倍					
スミチオンMC	MEPマイクロカブセル 剤	カメムシ類	3.2~4 倍	収穫21日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
スミチオン乳剤	MEP乳剤	カメムシ類	8倍	収穫21日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		ニカメイチュウ						

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
ダントツフロアブル	クロチアニジン水和剤	ウカ類	24倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
		カメシ類						
トレボンエア-	エトフェンプロックス乳剤	イコ類	8倍	収穫14日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
		コブノメイカ						
		ツマグロヨコバイ						
		フタオビコヤカ						
トレボンスカイMC	エトフェンプロックスマイクロカプセル剤	カメシ類	16倍	収穫14日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
		ヒメトビウカ						
ダブルカットKフロアブル	エチプロール・カサガマイシン・トリシクラゾール水和剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
		カメシ類						
ダブルカットスタークルフロアブル	シノテフラン・カサガマイシン・トリシクラゾール水和剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
ダブルカットレホンフロアブル	エトフェンプロックス・カスガマイシン・トリシクラゾール水和剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
		コブノメイガ						
		ツマグロヨコバイ						
		もみ枯細菌病						
		内穎褐変病						
トライクロアブル	エチプロール・テブフロキン水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
		稲こうじ病						
トライエミリアフロアブル	フルピリミン・テブフロキン水和剤	イネドクイムシ	8倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普	I
		いもち病						
		ウカ類						
		カメシ類						
		ツマグロヨコバイ						
		穂枯れ(ごま葉枯病菌)						

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
ノンブラスタントツプロアブル	クロチアミジン・トリシクラゾール・フェリムゾン水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
ビームエイトEXゾル	スルキサフロル・トリシクラゾール水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
ビームエイトエクストゾル	スルキサフロル・トリシクラゾール水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
ビームエイトスタークルゾル	ジノテフラン・トリシクラゾール水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
		ツマゲロヨコハイ						
ビームエイトトレボンゾル	エトフェンプロックス・トリシクラゾール水和剤	いもち病	5倍	収穫14日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
ブラシキラップフロアブル	エチプロール・フェリムゾン・フサライド水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫 雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性	魚 毒性
ブラシダントツプロアブル	クロチアミン・フェリム ゾン・フサライド水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
プレートスターカルゾル	シノテフラン・フェリム ゾン・フサライド水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
ラブサイトK2プロアブル	エチプロール・フサライ ド水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前 まで	2回以内	無人航空機に よる散布	普	I
		カメシ類						
ラブサイトスターカルプロアブル	シノテフラン・フサライ ド水和剤	いもち病	4倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						
ラブサイトダントツプロアブル	クロチアミン・フサライ ド水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布	普	I
		ウカ類						
		カメシ類						

(2) 水稲 (除草剤)

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
アットウZ400FG	テフリトリオン・ ピラクロル・フ ロピリスルフロ ン粒剤	移植 水稲	アミド・ロ・藻類によ る表層はく離	400g/ 10a	移植後3日 ～ヒ ¹ 4葉 期 ただ し、収穫60 日前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			一年生雑草								
			多年生広葉雑草								
アットウZ700フル	テフリトリオン・ ピラクロル・フ ロピリスルフロ ン水和剤	移植 水稲	アミド・ロ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	移植後3日 ～ヒ ¹ 4葉 期 ただ し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			イソノキサカ ^サ								
			一年生雑草								
			多年生広葉雑草								
アッパ ^レ Z400FG	ピラクロル・フ ロピリスルフロ ンプロモ ^チ ト粒剤	移植 水稲	アミド・ロ・藻類によ る表層はく離	400g/ 10a	移植後3日 ～ヒ ¹ 3葉 期 ただ し、移植後 30日 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			イソノキサカ ^サ								
			一年生雑草及び多 年生広葉雑草								
アトリ豆つぶ 250	ピリスルファン 剤	移植 水稲	ヒ ¹ エ	250g/ 10a	移植後14 日(稲5葉 期以降)～ ヒ ¹ 4葉期 但し、収 穫45日前 まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			多年生広葉雑草								
イネキング ^フ 0700フル	ピラクロル・ヒ ラゾレート・ベン ゾピシクロン水 和剤	移植 水稲	ウリカ	500mL /10a	移植直後 ～ヒ ¹ 2.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			オモダ ^カ								
			クログ ^{ワイ}								
			ヒルム ^{シロ}								
			ヘラオモダ ^カ								
			ホタル ^イ								
			マツハ ^イ								
			ミス ^ガ ヤツリ								
			一年生雑草								
ウイト ^コ A200SD 粒剤	フロピ ^ラ ウキシ フェン ^ベ ン ^ジ ル ベ ^ノ キスラム ベンゾ ^ピ シクロ ン粒剤	移植 水稲	ウリカ	200g/ 10a	移植後10 日～ヒ ¹ 4 葉期 ただ し、収穫60 日前まで	2回以 内	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ゼリ								
			ヒルム ^{シロ}								
			ホタル ^イ								
			マツハ ^イ								
			ミス ^ガ ヤツリ								
			一年生雑草								

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ウイニングランフロアブル	イフフェンカルハゾン・プロモフチン・ベンスルフロンメチル水和剤	移植 水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植直後～ヒエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下とする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			シスイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
カルティエZ350FG	シクロリモレート・ヒラズレート・プロリスルフロンの粒剤	移植 水稻	エゾノサヤカグサ	350g/10a	移植後5日～ヒエ3葉期 但し、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			一年生雑草								
			多年生広葉雑草								
エーワンフロアブル	オキサジクロメロン・テフリトリオン水和剤	移植 水稻	ウリカ	500mL/10a	移植後5日～ヒエ3葉期 但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布又は水口施用又は無人航空機による滴下	砂壤土～埴土	無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			オモダカ								
			クログワイ(北海道を除く)								
			セリ(北陸を除く)								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ(北海道を除く)								
水田一年生雑草											
カイリキZフロアブル	イフフェンカルハゾン・テフリトリオン・プロリスルフロンの水和剤	移植 水稻	一年生雑草	500mL/10a	移植後3日～ヒエ3葉期 但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			多年生広葉雑草								
カウンスルコンプレイトフロアブル	テフリトリオン・トリアアモン水和剤	移植 水稻	ウリカ	500mL/10a	移植後5日～ヒエ3.5葉期 但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			オモダカ								
			キシュウスノメヒエ								
			クログワイ								
			コウキガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ガホシフロアブル	イフェンカルハ ゾン・テフリトリ オン・ベンシルフ ロニメチル水和剤	移植 水稲	アミド・ロ・藻類による表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～ヒ ² E2.5 葉期但し、 移植後30 日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人ヘ リコプター による滴下		無人ヘリコプターによる滴下のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クダマ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
ガツツZ200FG	テフリトリオン・ プロピリスル フロン粒剤	移植 水稲	アミド・ロ・藻類による表層はく離	200g/ 10a	移植後3日 ～ヒ ³ E3.5 葉期 だ だし、収穫60 日前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クダマ								
			コウキカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											
ガツツフロアブル	テフリトリオン・ プロピリスル フロン水和剤	移植 水稲	アミド・ロ・藻類による表層はく離	500mL /10a	移植後3日 ～ヒ ³ E3葉 期だ だし、移植 後30日ま で	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クダマ								
			コウキカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											
カラット400FG	イマゾスル フロン・テ フリトリオン ・ピラクロ ニル粒剤	移植 水稲	アミド・ロ・藻類による表層はく離	400g/ 10a	移植直後 ～ヒ ² E2.5 葉期 だ だし、移植 後30日ま で	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クダマ								
			コウキカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
ミスガヤツリ											
一年生雑草											

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
キラテフロアブル	イ ^o フェンカルハ ^o ゾ ^o ン ^o テフリトリオン ^o 水 ^o 和 ^o 剤	移植水稲	アミド ^o ロ ^o 藻類による表層はく離	500mL/10a	移植直後～ヒ ^o E3葉期但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下		無人ヘリコプターによる滴下のみとする。	普	I
			ウリカワ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			シスイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
水田一年生雑草											
キラ400FG	イマゾスルフロ ^o ン ^o テフリトリオン ^o ・ヒ ^o ラクロニル ^o 粒 ^o 剤	移植水稲	アミド ^o ロ ^o 藻類による表層はく離	400g/10a	移植直後～ヒ ^o E2.5葉期 ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			ウリカワ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
キラフロアブル	イマゾスルフロ ^o ン ^o テフリトリオン ^o ・ヒ ^o ラクロニル ^o 水 ^o 和 ^o 剤	移植水稲	アミド ^o ロ ^o 藻類による表層はく離	500mL/10a	移植直後～ヒ ^o E2.5葉期 ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ウリカワ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
クサハルカンフロアブル	ヒ ^o ラクロニル ^o ・ヒ ^o ラゾ ^o レート ^o ・ベンゾ ^o ビ ^o シクロ ^o ン ^o 水 ^o 和 ^o 剤	移植水稲	ウリカワ	500mL/10a	移植直後～ヒ ^o E2.5葉期 ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			オモダカ								
			クログワイ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性					
ケサメツツフロアブル	テニクロール・ヘンシルフロメチル水和剤	移植水稲	アミト ^ロ ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植後5日～ ^レ 12葉期 ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下	砂壌土	無人ヘリコプターによる滴下のみとする。	普	I					
			ウリカワ													
			オモダカ													
			クログワイ													
			セリ													
			ヒルムシロ													
			ホタルイ													
			マツハイ													
			ミスガヤツリ													
			水田一年生雑草													
			アミト ^ロ ・藻類による表層はく離		移植直後～ ^レ 12葉期 ただし、移植後30日まで			1回				原液湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下	砂壌土 ～ 埴土	無人ヘリコプターによる滴下のみとする。	普	I
			ウリカワ													
			オモダカ													
			クログワイ													
			セリ													
			ヒルムシロ													
			ホタルイ													
			マツハイ													
			ミスガヤツリ													
			水田一年生雑草													
クリンチャー-EW	シハロホップ ^フ チル乳剤	移植水稲	^レ 12 ^エ	100mL/10a	移植後20日～ ^レ 12 ^エ 4.5葉期 但し、収穫30日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普	I						
ゲハート ^エ ア ^レ 粒剤	タ ^ム イ ^ム ン ^ヒ ラクロニル ^ヘ ンソ ^ビ シクロ ^ン メタゾ ^ス ルフロ ^ン 粒剤	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草	400g/10a	移植後14日～ ^レ 12 ^エ 4葉期 ただし、収穫60日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I					
サキ ^ケ 楽 ^粒	イ ^フ エンカル ^ハ ゾン ^テ フルトリオン ^フ ロ ^レ ビ ^ラ キシ ^フ エン ^ヘ ンソ ^ル 粒剤	移植水稲	ウリカワ	250g/10a	移植直後～ ^レ 12 ^エ 3葉期 但し、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I					
			エソ ^ノ サヤヌカ ^ガ サ													
			オモダカ													
			クログワイ													
			シ ^ス イ													
			セリ													
			ナ ^ガ エツル ^ノ ゲ ^イ トウ													
			ヒルムシロ													
			ヘ ^ラ オモ ^ダ カ													
			ホタルイ													
			マツハイ													
			ミスガヤツリ													
			一年生雑草													

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
サスケ粒剤200	カフェストール・シクロスファミロン・タムロン・ペンゾピシロン粒剤	移植水稲	アミド・ロ・藻類による表層はく離	200g/10a	移植後3日～ヒエ2葉期ただし、移植後30日まで	1回	水口施用、湛水散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クダマ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
サラブレッドGO400FG	イマゾスルホン・オキサジクロメロン・ピラクロニル・プロモプチド粒剤	移植水稲	アミド・ロ・藻類による表層はく離	400g/10a	移植直後～ヒエ2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クダマ								
			コウキカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
サラブレッドGO700アブル	イマゾスルホン・オキサジクロメロン・ピラクロニル・プロモプチド水和剤	移植水稲	アミド・ロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植直後～ヒエ2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クダマ								
			コウキカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
サラブレッドKAI1400FG	イマゾスルホン・オキサジクロメロン・ピラクロニル粒剤	移植水稲	ウリカ	400g/10a	移植直後～ヒエ2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			オモダカ								
			クダマ								
			コウキカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
サブレット®KAI707A アブル	イマゾスルフォン・オキサジクロメソン・ヒラクロニル水和剤	移植 水稻	アミド・ロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植直後～ヒ®I2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布又は無人ヘリコプターによる滴下		無人ヘリコプターによる滴下のみとする。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカガラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
ジエイソウルフロアブル	シクロピリメト・ヒラゾレート・フェントラザミド水和剤	移植 水稻	アミド・ロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植直後～ヒ®I2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ウリカ								
			エゾノサヤカグサ								
			オモダカ								
			シスイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
ジエイフレント®400FG	オキサジクロメソン・テフリルトリオソン・ヒラクロニル粒剤	移植 水稻	ウリカ	400g/10a	移植後5日～ヒ®I3葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			オモダカ								
			クログワイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
			ジヤングラムMX豆つぶ250								
多年生広葉雑草											
ゼータタイガー®300FG	プロピリスルフォン・プロモブチド・ヘントキサゾン粒剤	移植 水稻	アミド・ロ・藻類による表層はく離	300g/10a	移植後3日～ヒ®I3葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			エゾノサヤカグサ								
			一年生雑草								
			多年生広葉雑草								

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ゼータイカ-フロアブル	プロピリスルホン・プロモチド・ヘントキサゾン水和剤	移植水稲	アミド・ロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植後3日～ヒ ^レ E3葉期ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ウリカ								
			エゾノサヤカグサ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカラ								
			シスイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
水田一年生雑草											
ゼータプラス200FG	フェンキトリオン・プロピリスルホン粒剤	移植水稲	エゾノサヤカグサ	200g/10a	移植後3日～ヒ ^レ E4葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			一年生雑草								
			多年生広葉雑草								
ダクショット200SD粒剤	カフェストール・フルビラウキフェンベンゾピシロン粒剤	移植水稲	ウリカ	200g/10a	移植後3日～ヒ ^レ E3葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			エゾノサヤカグサ								
			オモダカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ツルギ250粒剤	イフェンカルハゾン・イマゾスロン・ベンゾピシロン粒剤	移植水稲	一年生雑草	250g/10a	移植直後～ヒ ^レ E2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			多年生広葉雑草								
デオレア-粒剤	オキサジクロメソン・テフリルトリオン・メタゾスロン粒剤	移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草	400g/10a	移植後1日～ヒ ^レ E3葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
トリニフィロアブル	イゾフェンカルハ ゾン・テフリルリ オン・ベンズルフ ロニル水和剤	移植 水稻	アミド・ロ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～ヒ ^レ E2.5 葉期 但 し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			シスイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
			ハッチリ400FG								
ウリカ											
オモダカ											
クログワイ											
コウキカ ^ラ											
シスイ											
セリ											
ヒルムシロ											
ヘラオモダカ											
ホタルイ											
マツハイ											
ミスガヤツリ											
水田一年生雑草											
ハッチリLX400FG	イマゾスルフロ ン・オキサジ ^ン クロメ ン・ピラクロニル ・フロモフチド ^レ 粒剤	移植 水稻	一年生雑草	400g/ 10a	移植直後 ～ヒ ^レ E2.5 葉期 た だし、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			多年生広葉雑草								
ハッチリLXフロアブ ル	イマゾスルフロ ン・オキサジ ^ン クロメ ン・ピラクロニル ・フロモフチド ^レ 水和剤	移植 水稻	ウリカ	500mL /10a	移植直後 ～ヒ ^レ E2.5 葉期 た だし、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			エゾノサヤヌカ ^ガ サ								
			オモダカ								
			クログワイ								
			コウキカ ^ラ								
			シスイ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性						
ヒエクリン豆つぶ250	ピリミホリック剤	移植水稲	ヒエ	250g/10a	移植後15日～ヒエ14葉期 但し、収穫45日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人ヘリコプターによる散布		無人ヘリコプターによる散布のみとする。	普	I						
ビクター-Z400FG	ピラクロニル・フロピリスルフォン粒剤	移植水稲	アミドロ・藻類による表層はく離 一年生雑草 多年生広葉雑草	400g/10a	移植後5日～ヒエ3葉期 但し、収穫60日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I						
ビクター-Zフロアブル	ピラクロニル・フロピリスルフォン水和剤	移植水稲	アミドロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植後5日～ヒエ3葉期 但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下		無人ヘリコプターによる滴下のみとする。	普	I						
			ウリカ														
			エノサヤカサ														
			ホトカ														
			クワワイ														
			コウキカラ														
			シスイ														
			セリ														
			ヒルシロ														
			ハラホトカ														
			ホタルイ														
			マツハイ														
			ミスガヤツリ														
			水田一年生雑草														
ペンケイ豆つぶ250	ピリミホリック剤	移植水稲	アミドロ・藻類による表層はく離 一年生雑草 多年生広葉雑草	250g/10a	移植後3日～ヒエ3葉期 但し、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I						
ホットコンビ200粒剤	テルクロール・ペンソビシクロン粒剤	移植水稲	ヒルシロ	200g/10a	移植直後～ヒエ2葉期 但し、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I						
			ホタルイ														
			マツハイ														
			ミスガヤツリ														
			一年生雑草														
ホットコンビフロアブル	テルクロール・ペンソビシクロン水和剤	移植水稲	ヒルシロ	300mL/10a	植代後～移植前7日または移植直後～ヒエ1.5葉期 但し、移植後30日まで	2回以内	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		移植前に処理しない。無人航空機による滴下のみとする。	普	I						
			ハラホトカ														
			ホタルイ														
			マツハイ														
			ミスガヤツリ														
			一年生雑草														
										ヒルシロ	500mL/10a	移植直後～ヒエ2葉期 但し、移植後30日まで			無人航空機による滴下のみとする。		
										ハラホトカ							
										ホタルイ							
										マツハイ							
ミスガヤツリ																	
一年生雑草																	

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ホテガードプロアブル	テフリトリオン・トリアアモン水和剤	移植 水稻	ウリカ	500mL /10a	移植後5日 ～レ ¹ 3.5 葉期 ただし、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水口 施用又は無人航空機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
			オモダカ								
			キシュスメンヒエ								
			クダマ								
			コウキカラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
カゼー400FG	ピラクロニル・プロピリスルフロ ン粒剤	移植 水稻	アミロ・藻類による 表層はく離	400g/ 10a	移植後5日 ～レ ¹ 3葉 期ただし、 収穫60日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			一年生雑草								
			多年生広葉雑草								
レゼー300FG	フェンキトリオン・ プロピリスルフロ ン・プロモチ ド粒剤	移植 水稻	ウリカ	300g/ 10a	移植後3日 ～レ ¹ 4葉 期 だ だし、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			オモダカ								
			クダマ								
			コウキカラ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
レラスエー粒剤	ジメタメリン・ タムロン・テフ リトリオン・メタゾ スルフロ ン粒剤	移植 水稻	一年生雑草及び多 年生広葉雑草	400g/ 10a	移植後14 日～レ ¹ 4 葉期 だ だし、収穫60 日前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
ワザリ楽粒	イフエンカルハ ゾン・テフリトリ オン粒剤	移植 水稻	ウリカ	250g/ 10a	移植直後 ～レ ¹ 3葉 期 但し、 移植後30 日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又は 無人航空 機による 散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			オモダカ								
			クダマ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
天空I7-粒剤	フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン粒剤	移植 水稻	一年生雑草	300g/ 10a	移植後1日 ～/ビ ¹ I3葉期 ただし、移植後 30日まで	1回	湛水散布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機による 散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			多年生広葉雑草								
天空F7アブル	フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン水和剤	移植 水稻	一年生雑草及び多 年生広葉雑草	500mL /10a	移植直後 ～/ビ ¹ I3葉期 ただし、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
流星I7-粒剤	フェンキトリオン・ ペンタキサゲン・ メタゾスルフロン 粒剤	移植 水稻	一年生雑草及び多 年生広葉雑草	400g/ 10a	移植後3日 ～/ビ ¹ I3葉期 ただし、移植後 30日まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機による 散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
アットウZ7アブル	テフリルトリオン・ ピラクロニル・フ ロピリスルフロ ン水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ /ビ ¹ I3葉期 ただし、収穫 90日前 まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
アッパ ^レ Z400FG	ピラクロニル・フ ロピリスルフロ ン・プロモプ ^チ ド粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビ ¹ I3葉期 ただし、収穫 90日前 まで	1回	湛水散布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機による 散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
アトリ豆つぶ 250	ピリスルファン 剤	直播 水稻	オモダカ	250g/ 10a	稲5葉期～ 収穫45日 前まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機による 散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			クログワイ								
イネキング ^フ アブル	ピラクロニル・ピ ラゾレート・ベン ゾビシクロン水 和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ /ビ ¹ I2.5葉 期 だ だし、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ウイニングランフロアブル	イフフェンカルハゾン・プロモフロム・ベンシルフロムメチル水和剤	直播水稲	ウリカ	500mL/10a	稲1葉期～ 1/2.5葉期 但し、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ウルティモZ350FG	シカロピリモレート・ヒラゾレート・プロピリスルフロム粒剤	直播水稲	ウリカ	350g/10a	稲1葉期～ 1/3.5葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	湛水散布、 湛水周縁 散布又は 無人航空機 による散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
エーワンフロアブル	オキサジクロメソン・テフリトリオン水和剤	直播水稲	ウリカ	500mL/10a	稲1葉期～ 1/3葉期 但し、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 水口施用 又は無人 ヘリコプター による滴 下	砂壤土～ 埴土	無人ヘリコプター による滴下 のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
カイリキZフロアブル	イフフェンカルハゾン・テフリトリオン・プロピリスルフロム水和剤	直播水稲	ウリカ	500mL/10a	稲1葉期～ 1/3葉期 但し、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
カウンシルコンプレイト フロアフル	テフリトリオン・ト リアアモン水和 剤	直播 水稲	ウリカ	500mL /10a	は種直後 ～1/13.5 葉期 だ だし、収 穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
カチホシフロアフル	イフェンカルハ リン・テフリトリ オン・ヘンシルフ オンメチル水和剤	直播 水稲	アミドロ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	稲1葉期～ 1/12.5葉 期 但し、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人ヘリ コプター による滴 下		無人ヘリコ プターに よる滴下 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
ガットZ200FG	テフリトリオン・ プロピリスルフ オン粒剤	直播 水稲	アミドロ・藻類によ る表層はく離	200g/ 10a	稲1葉期～ 1/13葉期 ただし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ガットZフロアフル	テフリトリオン・ プロピリスルフ オン水和剤	直播 水稲	アミドロ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	稲1葉期～ 1/13葉期 ただし、収 穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
クラット400FG	イマゾ スルフロ ン・テフリルトリオン ・ピラクロニル粒 剤	直播 水稲	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビ°E2.5葉 期 ただ し、収穫90 日前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハ°イ								
			ミス°ガ°ヤツリ								
			一年生雑草								
キマリテフロアブル	イ°フェンカルハ °ン・テフリルトリ オン水和剤	直播 水稲	アミド°ロ°藻類によ る表層はく離	500mL /10a	稲1葉期～ /ビ°E3葉期 但し、収穫 90日前ま で	1回	原液湛水 散布又は 無人ヘリコ プターによ る滴下		無人ヘリコプター による滴下 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハ°イ								
			ミス°ガ°ヤツリ								
水田一年生雑草											
キラリ400FG	イマゾ スルフロ ン・テフリルトリオン ・ピラクロニル粒 剤	直播 水稲	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビ°E2.5葉 期 ただ し、収穫90 日前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハ°イ								
			ミス°ガ°ヤツリ								
			一年生雑草								
キラリアブル	イマゾ スルフロ ン・テフリルトリオン ・ピラクロニル水 和剤	直播 水稲	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ /ビ°E2.5葉 期 ただ し、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハ°イ								
			ミス°ガ°ヤツリ								
			一年生雑草								

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ケサバルカンフロアブル	ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾピシロン水剤	直播水稲	ウリカワ	500mL/10a	稲1葉期～ /ピエ2.5葉期 ただし、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
クリンチャー-EW	シハロップ [®] フチル乳剤	直播水稲	一年生イネ科雑草	100mL/10a	は種後10日～ /ピエ4.5葉期 但し、収穫 30日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普	I	
ゲハート [®] エア [®] -粒剤	ダイムロン・ピラクロニル・ベンゾピシロン・メタゾスルフロ [®] 粒剤	直播水稲	ウリカワ	400g/10a	稲1葉期～ /ピエ4葉期 ただし、収穫 60日前まで	1回	湛水散布、 湛水周縁散布 又は無人 航空機による 散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			ゼリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
サキガケ薬粒	イプフェンカルハゾン・テフリトリオン・フォルピラキシフェン [®] ベンゾ [®] 粒剤	直播水稲	ウリカワ	250g/10a	稲1葉期～ /ピエ2.5葉期 但し、収穫90日 前まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機による 散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			ゼリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
サスケ粒剤200	カフェンストロール・シクロスルファミン・ダイムロン・ベンゾピシロン [®] 粒剤	直播水稲	ウリカワ	200g/10a	稲1葉期～ /ピエ2葉期 ただし、収穫60日 前まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機による 散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			ゼリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
サプラレット® GO400FG	イマゾスルフロン・ オキサジクロメソ ン・ヒラクロニル プロモプチド 粒剤	直播 水稻	アミトロ・藻類によ る表層はく離	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビエ2.5葉 期 ただ し、収穫90 日前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
サプラレット® GO70 アブル	イマゾスルフロン・ オキサジクロメソ ン・ヒラクロニル プロモプチド 水和剤	直播 水稻	アミトロ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	稲1葉期～ /ビエ2.5葉 期 ただ し、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
サプラレット® KAI400FG	イマゾスルフロン・ オキサジクロメソ ン・ヒラクロニル 粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビエ2.5葉 期 但し、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
サプラレット® KAI7 0アブル	イマゾスルフロン・ オキサジクロメソ ン・ヒラクロニル 水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ /ビエ2.5葉 期 ただ し、収穫 90日前ま で	1回	原液湛水 散布又は 無人ヘリ コプター による滴 下		無人ヘリコ プターに よる滴下 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性	魚毒性
ジェイソルフロアブル	シクロピリメト・ヒラゾレート・フェントラザミト水和剤	直播水稲	ウリカ	500mL/10a	稲1葉期～ヒ ¹ E2.5葉期ただし、収穫90日前まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普	I
			ヒルムシロ								
			ヘラモタカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ジェイフレント400FG	オキサジクロメノン・テフリルトリオン・ヒラクロニル粒剤	直播水稲	ウリカ	400g/10a	稲1葉期～ヒ ¹ E2.5葉期ただし、収穫60日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ジャンタムMX豆つぶ250	ピリフタリド・ヒリスルファンメソトリオン剤	直播水稲	ウリカ	250g/10a	稲1葉期～ヒ ¹ E3.5葉期ただし、収穫90日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ゼータイガー300FG	プロピリスルホン・プロモチド・ヘントキサゾン粒剤	直播水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	300g/10a	稲1葉期～ヒ ¹ E3葉期ただし、収穫90日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
ゼータイカ-フロアブル	プロピリスルホン・プロピチト・ヘンソクザン水和剤	直播 水稻	アミトロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	稲1葉期～ /ビ ¹ E3葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
ゼータプラス 200FG	フェンキトリオン・プロピリスルホン粒剤	直播 水稻	アミトロ・藻類による表層はく離	200g/10a	稲1葉期～ /ビ ¹ E4葉期 ただし、収 穫75日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又は 無人航空 機による 散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ダクシヨット 200SD粒剤	カフェンストロール・フロルピラウキシン・フェンペンジル・ヘンソクビシクロン粒剤	直播 水稻	ウリカ	200g/10a	稲1葉期～ /ビ ¹ E3葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は無 人航空機 による散 布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
			ツルキ ² 250粒剤								
セリ											
ヒルムシロ											
ホタルイ											
マツハイ											
ミスガヤツリ											
一年生雑草											

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
ディオレア-粒 剤	オキサジクロメ ン・テフリルトリ オン・メタゾスル フロン粒剤	直播 水稲	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビ ¹ E3葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハ ¹ イ								
			ミス ¹ ガ ¹ ヤツリ								
			一年生雑草								
トリニフィロア ¹ ル 剤	イ ¹ フ ¹ エン ¹ カ ¹ ル ¹ バ ¹ ジ ¹ ン ¹ ・テ ¹ フ ¹ リ ¹ ル ¹ ト ¹ リ ¹ オン ¹ ・ヘ ¹ ン ¹ ス ¹ ル ¹ フ ¹ ロン ¹ メ ¹ チ ¹ ル ¹ 水 ¹ 和 ¹ 剤	直播 水稲	アミド ¹ ロ ¹ ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	稲1葉期～ /ビ ¹ E2.5葉 期 但し、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ヘラオモタ ¹ カ								
			ホタルイ								
			マツハ ¹ イ								
ミス ¹ ガ ¹ ヤツリ											
水田一年生雑草											
ハ ¹ ッ ¹ チ ¹ リ ¹ 400FG	イ ¹ マ ¹ ゾ ¹ ス ¹ ル ¹ フ ¹ ロ ¹ ン ¹ ・ヒ ¹ ラ ¹ ク ¹ ロ ¹ ニ ¹ ル ¹ ・ フ ¹ ロ ¹ モ ¹ フ ¹ チ ¹ ド ¹ 粒 剤	直播 水稲	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビ ¹ E2.5葉 期ただし、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハ ¹ イ								
			ミス ¹ ガ ¹ ヤツリ								
			水田一年生雑草								
ハ ¹ ッ ¹ チ ¹ リ ¹ X400FG	イ ¹ マ ¹ ゾ ¹ ス ¹ ル ¹ フ ¹ ロ ¹ ン ¹ ・オ ¹ キサ ¹ ジ ¹ ク ¹ ロ ¹ メ ン ¹ ・ヒ ¹ ラ ¹ ク ¹ ロ ¹ ニ ¹ ル ¹ ・ フ ¹ ロ ¹ モ ¹ フ ¹ チ ¹ ド ¹ 粒 剤	直播 水稲	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ /ビ ¹ E2.5葉 期 ただ し、収穫90 日前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又は 無人航空 機による 散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ホタルイ								
			マツハ ¹ イ								
			ミス ¹ ガ ¹ ヤツリ								
			一年生雑草								

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
ハッチリXフロアブル	イマゾスルフォン・オキサジクロメリン・ピラクロニル・プロモトチド水和剤	直播水稲	ウリカ	500mL/10a	稲1葉期～ /ビ ¹ E2.5葉期 ただし、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ハラモダカ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
ヒエクリン豆つぶ250	ピリミノハックメチル剤	直播水稲	ノビエ	250g/10a	稲3葉期～ /ビ ¹ E3葉期 但し、収穫 45日前まで	1回	湛水散布 又は無人 ヘリコプター による散布		無人ヘリコプター による散布 のみとする。	普	I
ビクトリーZ400FG	ピラクロニル・プロピリスルフォン粒剤	直播水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	400g/10a	稲1葉期～ /ビ ¹ E3葉期 ただし、収穫60日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
ビクトリーZフロアブル	ピラクロニル・プロピリスルフォン水和剤	直播水稲	ウリカ	500mL/10a	稲1葉期～ /ビ ¹ E3葉期 ただし、収穫60日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人ヘリ コプターに よる滴下		無人ヘリコプター による滴下 のみとする。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハイ								
			ミスガヤツリ								
			水田一年生雑草								
			ペンケイ豆つぶ250								
ウリカ											
セリ											
ヒルムシロ											
ホタルイ											
ミスガヤツリ											
一年生雑草											

◆注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和6年10月2日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壌	備考	毒 性	魚 毒 性
ホテ-ガード [®] プロアブル	テフリルトリオン・トリファモン水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	は種直後 ～ ^レ 13.5 葉期 だ だし、収 穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハ [®] イ								
			ミスガヤツリ								
			一年生雑草								
カセ-タ400FG	ピラクロニル・プロピリスルフロ ン粒剤	直播 水稻	アミド [®] ・藻類によ る表層はく離	400g/ 10a	稲1葉期～ ^レ 13葉期 ただし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			ウリカ								
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
レラスエア-粒剤	ジメタメリン・ ダイムロン・テフリ ルトリオン・メタゾ スルフロ [®] ン粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ ^レ 14葉期 ただし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハ [®] イ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
天空 [®] ア-粒剤	フェントラザミ ド [®] ・ベンゾ [®] ピ シクロン [®] ・メタゾ [®] スルフロ [®] ン粒剤	直播 水稻	ウリカ	300g/ 10a	稲1葉期～ ^レ 13葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハ [®] イ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
天空 [®] アブル	フェントラザミ ド [®] ・ベンゾ [®] ピ シクロン [®] ・メタゾ [®] スルフロ [®] ン水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ ^レ 13葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハ [®] イ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											
流星 [®] ア-粒剤	フェンキトリオン [®] ・ ヘントキサ [®] ン [®] ・ メタゾ [®] スルフロ [®] ン粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ ^レ 13葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	湛水散 布又は 無人航空 機による 散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普	I
			セリ								
			ヒルムシロ								
			ホタルイ								
			マツハ [®] イ								
			ミスガヤツリ								
一年生雑草											

(3) 麦類・大豆 (殺菌・殺虫剤)

◆注意事項

- ・一覧表の農業登録内容は令和6年10月2日現在のものです。
- ・農業の使用にあたっては、必ず手持ちの農業容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	備考	毒性	魚毒性
シルバキアフロアブル	テブコナゾール水和剤	大麦	うどんこ病	16倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普	I
			赤かび病							
		小麦	うどんこ病		収穫7日前まで					
			赤かび病							
		赤さび病								
フルト乳剤25	フロビコナゾール乳剤	大麦	赤かび病	8倍	収穫21日前まで	1回	無人航空機による散布		普	I
		小麦			収穫7日前まで	3回以内				
トップジンMゾル	チオファネートメチル水和剤	小麦	赤かび病	8倍	収穫14日前まで	3回以内(出穂期以降は2回以内)	無人航空機による散布		普	I
		麦類(小麦を除く)			収穫21日前まで					
ミラビスフロアブル	ビシメクトフェン水和剤	大麦	赤かび病	8~16倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普	II
		小麦			収穫7日前まで					
ワークアップフロアブル	トリコナゾール水和剤	麦類	うどんこ病	10~16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布		普	I
			黄斑病							
			赤さび病							
			赤かび病	10~24倍						
スミチオン乳剤	MEP乳剤	小麦	アブラムシ類	8倍	収穫7日前まで	1回	無人航空機による散布		普	I
		大麦								
アミスター20フロアブル	アジキリストロピン水和剤	だいず	紫斑病	16~24倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普	I
トップジンMゾル	チオファネートメチル水和剤	だいず	紫斑病	5~8倍	収穫14日前まで	4回以内	無人航空機による散布		普	I
トライフロアブル	テブコナゾール水和剤	だいず	紫斑病	16倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普	I
				8倍						
ファンタジスタフロアブル	ビリベンカルブ水和剤	だいず	菌核病	16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布		普	I
			紫斑病							
フセキフロアブル	ビリタクロメチル水和剤	だいず	紫斑病	24~32倍	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布		普	I
ブランドム乳剤25	ジフェノコナゾール乳剤	だいず	紫斑病	16~24倍	開花後~ 収穫7日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布		普	I
スタークルイト液剤10	ジメテフラン液剤	だいず	カメムシ類	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普	I
			ダースヤタマハ							
			ワタスジヒメムシ							
スタークル液剤10	ジメテフラン液剤	だいず	カメムシ類	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普	I
			ダースヤタマハ							
			ワタスジヒメムシ							
スミチオンレボソール乳剤	イトフェンロックス・MEP乳剤	だいず	カメムシ類	8倍	収穫21日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布		普	I

スミチオン乳剤	MEP乳剤	だいたず	ウコンノメイカ [®]	8倍	収穫21日 前まで	4回以内	無人航空機 による散布		普	I
			カメムシ類							
			シロイチモン [®] マダ [®] ラ メイカ [®]							
			ダ [®] イス [®] サヤタマハ [®] エ							
			ダ [®] イス [®] サヤムシカ [®]							
マメシクイカ [®]										
トレホ [®] ンエアー	イトフェン [®] ロックス 乳剤	だいたず	カメムシ類	8倍	収穫14日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布		普	I
			ツメクサガ [®]							
			ハスモンヨトウ							
			マメシクイカ [®]							
トレホ [®] ンスカイMC	イトフェン [®] ロックス マイクロカ [®] セル剤	だいたず	カメムシ類	8~16倍	収穫14日 前まで	2回以内	無人ヘリコプター による散布		普	I
			ハスモンヨトウ							
			マメシクイカ [®]	16倍 8倍						
ノモルト乳剤	テフルベ [®] ンス [®] ロン 乳剤	だいたず	ハスモンヨトウ	8~16倍	収穫14日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布		普	I
プロレオフロアブル	ビ [®] リタ [®] リル水和 剤	だいたず	ハスモンヨトウ	8~16倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人航空機 による散布		普	I
プロレバ [®] ソフロアブル5	クララントラニリ [®] ロール水和剤	だいたず	ウコンノメイカ [®]	16~32倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人航空機 による散布		普	I
			オオタハ [®] コカ [®]							
			ハスモンヨトウ							
			マメシクイカ [®]							
プロフレアSC	プロフラニリ [®] 水和剤	だいたず	オオタハ [®] コカ [®]	16~32 倍	収穫前日 まで	3回以内	無人航空機 による散布		普	I
			ダ [®] イス [®] サヤタマ ハ [®] エ							
			ハスモンヨトウ							
			フタスジ [®] ヒメハム シ							
ベ [®] カ [®] サフロアブル	フルベ [®] ンジ [®] アミト [®] 水和剤	だいたず	ハスモンヨトウ	16~32倍	収穫7日前 まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布		普	I
ベ [®] ネビアOD	シアントラニリ [®] ロール水和剤	だいたず	アブラムシ類	32倍	収穫7日 前まで	3回以内	無人航空機 による散布		普	I
			ハスモンヨトウ							
			マメシクイカ [®]							
マトリックフロアブル	クラマフェノシ [®] ト [®] 水和剤	だいたず	ハスモンヨトウ	8~16倍	収穫前日 まで	3回以内	無人航空機 による散布		普	I
ミネクトエクストラSC	シアントラニリ [®] ロール・ルフェスロ ン水和剤	だいたず	ハスモンヨトウ	40~80 倍	収穫7日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布		普	I
				80~160 倍						
			マメシクイカ [®]	40~80 倍						
				80~160 倍						
ロムタ [®] ンエアー	テ [®] フェノシ [®] ト [®] 水和剤	だいたず	ハスモンヨトウ	16倍	収穫14日 前まで	3回以内	無人ヘリコプター による散布		普	I

無人航空機 麦類・大豆
(殺菌・殺虫剤)

無人航空機 麦類・大豆
(殺菌・殺虫剤)

アミスターレボ [®] SE	イトフェン [®] ロック ス・アゾ [®] キストロ ピ [®] ン水和剤	だいず [®]	ア [®] ラムシ類	8倍	収穫21日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布		普	I
			カ [®] ムシ類							
			ハ [®] スモントウ							
			マ [®] メシクイカ							
			紫斑病							