

(8) その他薬剤

注意事項

- ・ 一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・ 農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・ 普（普通物）とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

| 薬剤名 | 農薬の種類 | 適用病害虫雑草名 | 希釈倍数使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 毒性 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|--|------------|---------|---------------------------------|----|
| 加ハ [®] -粉粒剤16 | 過酸化カルシウム粉粒剤 | | 乾燥種粒重量の等倍～2倍量 | は種前浸種後 | 1回 | 湿粉衣(地上は種用、空中散播及び無人ヘリコプターによる散播用) | 普 |
| タチカ [®] レ-スM液剤 | ヒド [®] ロキソイキザール・メタキシルM液剤 | ムシ苗防止 | 1000倍 | は種時 | 1回 | 土壌灌注 | 普 |
| | | | 500～1000倍 | は種時又は発芽後 | | | |
| | | 移植時の活着促進 | 1000倍 | は種時 | | | |
| | | | 500～1000倍 | は種時又は発芽後 | | | |
| | | 根の生育促進 | 1000倍 | は種時 | | | |
| | | | 500～1000倍 | は種時又は発芽後 | | | |
| タチカ [®] レ-スM粉剤 | ヒド [®] ロキソイキザール・メタキシルM粉剤 | ムシ苗防止 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5 ^{kg})1箱当り6～8g | は種前 | 1回 | 育苗箱土壌に均一に混和 | 普 |
| | | 根の生育促進 | | | | | |
| ナエファインフロアブル | ピ [®] カルブトゾックス水和剤 | | 1000～2000倍 | は種時から緑化期 | 2回以内 | 土壌灌注 | 普 |
| | | | 2000倍 | は種時 | | | |
| ナエファイン粉剤 | ピ [®] カルブトゾックス粉剤 | | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5 ^{kg})1箱当り6～8g | は種前 | 1回 | 育苗箱土壌に均一に混和する。 | 普 |
| レシメン液剤 | シタケ菌糸体抽出物液剤 | 根部生育促進 | 1000倍 | 催芽前 | - | 48時間種子浸漬 | 普 |
| | | | 500倍 | 出芽揃期～移植5日前 | | 灌注 | |