

3. 無人航空機(無人ヘリコプター等) (1) 水稻(殺菌・殺虫剤)

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性
オリアライト250G	オミストピオン剤	いもち病	250g/10a	出穂10日前まで ただし、収穫45日前まで	1回	無人航空機による散布	普
		稲こうじ病					
		白葉枯病					
		穂枯れ(ごま葉枯病菌)					
		墨黒穂病					
紋枯病							
カスミンリダシ液剤	カガマイシン・ハリダマイシン液剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機による散布	普
		紋枯病					
カスミン液剤	カガマイシン液剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機による散布	普
ダブルカットフロアブル	カガマイシン・トリシクラゾール水和剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機による散布	普
		穂枯れ(ごま葉枯病菌)					
トライフロアブル	テフロキソ水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普
		稲こうじ病					
		穂枯れ(ごま葉枯病菌)					
ノンラスフロアブル	トリシクラゾール・フェリムゾン水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
ハシタックゾール	メフロニル水和剤	紋枯病	6~8倍	収穫14日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
ハリダシエア-	ハリダマイシン液剤	紋枯病	8倍	収穫14日前まで	5回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
ビームエイトゾール	トリシクラゾール水和剤	いもち病	5~8倍	収穫7日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
ビームエイトモンカットフロアブル	トリシクラゾール・フルトラニル水和剤	いもち病	5~8倍	収穫14日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普
		紋枯病					
ビームゾール	トリシクラゾール水和剤	いもち病	6~8倍	収穫7日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	劇
ソワソワ乳剤	ソワソワ乳剤	いもち病	8倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普
		稲こうじ病					
ブラシハリダゾール	ハリダマイシン・フェリムゾン・フサイド水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
		紋枯病					
ブラシフロアブル	フェリムゾン・フサイド水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普
		ごま葉枯病					
		もみ枯細菌病					
		稲こうじ病					
		褐条病					
		内穎褐変病					
		変色米(アルガリア菌)					
		変色米(ヒッコカ菌)					
		変色米(カブリア菌)					
		穂枯れ(ごま葉枯病菌)					
墨黒穂病							

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性
モノカトフロアブル	フルトラニル水和剤	疑似紋枯症(褐色菌核病菌)	8倍	収穫14日前まで	4回以内	無人航空機による散布	普
		疑似紋枯症(褐色紋枯病菌)					
		疑似紋枯症(赤色菌核病菌)					
		紋枯病					
モノカトラフ サイト 20フロアブル	フサライド・フルトラニル水和剤	いもち病	6~8倍	収穫14日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普
		紋枯病					
モンセレンフロアブル	ベンシクロン水和剤	紋枯病	8~10倍	収穫21日前まで	4回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
ラフ サイト ハ リタ フロアブル	ハ リタ マイシン・フサライド 水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普
		紋枯病					
ラフ サイト フロアブル	フサライド 水和剤	いもち病	5~8倍	収穫7日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
イクシード フロアブル	スルホキサフロル水和剤	ウカ類	16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普
		カムシ類					
		ツマク ロコハ イ					
エミアフロアブル	フルビ リミン水和剤	イネト ロイムシ	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普
		ウカ類					
		カムシ類					
		コフ ノメイカ					
オーケストラフロアブル	ベンズピリモキサノ水和剤	ウカ類幼虫	16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普
			8倍				
		ツマク ロコハ イ幼虫	16倍				
			8倍				
キラップ フロアブル	エチブ ロール水和剤	イネト ロイムシ	16倍	収穫14日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
		ウカ類	8~16倍				
		カムシ類					
スタークルメイト液剤10	ジネフラン液剤	ウカ類	16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普
			30倍				
			8倍				
		カムシ類	16倍				
ツマク ロコハ イ							
スタークル液剤10	ジネフラン液剤	ウカ類	16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普
			30倍				
			8倍				
		カムシ類	16倍				
ツマク ロコハ イ							
スミチオンMC	MEPマイクロカブセル剤	カムシ類	3.2~4倍	収穫21日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
スミチオン乳剤	MEP乳剤	カムシ類	8倍	収穫21日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普
		ニカメイチュウ					
ダントツフロアブル	クロチアジソン水和剤	ウカ類	24倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普
		カムシ類					

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性
トレボンエア	イトフェン [®] ロックス乳剤	イコ [®] 類	8倍	収穫14日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普
		ウカ類					
		カムシ類					
		コフノメイガ					
		ツマク [®] ロコバ [®] イ					
		フタホ [®] コヤガ					
トレボンスカイMC	イトフェン [®] ロックスマイクロカ [®] セル剤	カムシ類	16倍	収穫14日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
		ヒメビ [®] ウカ					
プロセバ [®] -フロアブル	ピメトリン [®] 水和剤	ウカ類	4~8倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	
		カムシ類					
		ツマク [®] ロコバ [®] イ					
ダブルカットフロアブル	エチ [®] ロール・カスガ [®] マイン・トリシクラ [®] ザール水和剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機による散布	普
		カムシ類					
ダブルカットスタークルフロアブル	ジ [®] ナフラン [®] ・カスガ [®] マイン・トリシクラ [®] ザール水和剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
		ウカ類					
		カムシ類					
ダブルカットトレボンフロアブル	イトフェン [®] ロックス・カスガ [®] マイン・トリシクラ [®] ザール水和剤	いもち病	8倍	穂揃期まで	2回以内	無人航空機による散布	普
		ウカ類					
		カムシ類					
		コフノメイガ					
		ツマク [®] ロコバ [®] イ					
		もみ枯細菌病					
内穎褐変病							
トライフロアブル	エチ [®] ロール・テブ [®] フロキ [®] 水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普
		ウカ類					
		カムシ類					
		稲こうじ病					
トライエミリアフロアブル	フルビ [®] リミン [®] ・テブ [®] フロキ [®] 水和剤	イネト [®] オイムシ	8倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普
		いもち病					
		ウカ類					
		カムシ類					
		ツマク [®] ロコバ [®] イ					
		稲こうじ病					
		穂枯れ(ごま葉枯病菌)					
ノブラスターントツフロアブル	カチ [®] アニン [®] ・トリシクラ [®] ザール・フェリム [®] ザール水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
		ウカ類					
		カムシ類					
ビームイトEX [®] ザール	スルホキサ [®] フロル [®] ・トリシクラ [®] ザール水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普
		ウカ類					
		カムシ類					

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・夏期一斉防除では、周辺作物や家畜・水産・養蜂等への影響に留意し、関係者への連絡・調整を必ず行うよう指導してください。
- ・夏期一斉防除では、トレボンについては、他の剤型タイプを含め、いずれか1回の使用となるよう指導してください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	毒性
ビームイトイクシートゾル	スルホキサロル・トリシクゾール水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	普
		ウンカ類					
		カメムシ類					
ビームイスタークルゾル	ジネフラン・トリシクゾール水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
		ウンカ類					
		カメムシ類					
		ツマグロヨコバイ					
ビームイトレボソゾル	イトフェンプロックス・トリシクゾール水和剤	いもち病	5倍	収穫14日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
		ウンカ類					
		カメムシ類					
ブラシキラップフロアブル	エチプロール・フェリムゾン・フサライド水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
		ウンカ類					
		カメムシ類					
ブラシタントツフロアブル	クロチアニジン・フェリムゾン・フサライド水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
		ウンカ類					
		カメムシ類					
ブレードスタークルゾル	ジネフラン・フェリムゾン・フサライド水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普
		ウンカ類					
		カメムシ類					
ラブサイトK2フロアブル	エチプロール・フサライド水和剤	いもち病	8倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	普
		カメムシ類					
ラブサイトスタークルフロアブル	ジネフラン・フサライド水和剤	いもち病	4倍	収穫7日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
		ウンカ類					
		カメムシ類					
ラブサイトダントツフロアブル	クロチアニジン・フサライド水和剤	いもち病	8倍	収穫7日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	普
		ウンカ類					
		カメムシ類					

(2) 水稲(除草剤)

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
アットウZ400FG	テフルトリオン・ピラコニル・プロピル・リスルフロンの粒剤	移植水稲	アミト・D・藻類による表層はく離	400g/10a	移植後3日～Ⅾ ¹⁴ 葉期 ただし、収穫60日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			一年生雑草							
			多年生広葉雑草							
アットウZフロアブル	テフルトリオン・ピラコニル・プロピル・リスルフロンの水和剤	移植水稲	アミト・D・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植後3日～Ⅾ ¹⁴ 葉期 ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			Ⅾ ¹⁴ ノヤスカグサ							
			一年生雑草							
			多年生広葉雑草							
アットウZ400FG	ピラコニル・プロピル・リスルフロンのプロピル・トの粒剤	移植水稲	アミト・D・藻類による表層はく離	400g/10a	移植後3日～Ⅾ ¹³ 葉期 ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			Ⅾ ¹⁴ ノヤスカグサ							
			一年生雑草及び多年生広葉雑草							
アトリ豆つぶ250	ピラコニル・プロピル・リスルフロンの水和剤	移植水稲	Ⅾ ¹⁴	250g/10a	移植後14日(Ⅾ ⁵ 葉期以降)～Ⅾ ¹⁴ 葉期 但し、収穫45日前まで	1回	湛水散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			多年生広葉雑草							
イネキングフロアブル	ピラコニル・プロピル・リスルフロンの水和剤	移植水稲	ウリカ	500mL/10a	移植直後～Ⅾ ^{12.5} 葉期 ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			オモダカ							
			ククワイ							
			ヒルムシロ							
			ハラオモダカ							
			ホタルイ							
			マツハイ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							
ウイトコア200SD粒剤	フルピラキフェンペンシル・ヘキサラム・ペンゾピシロンの粒剤	移植水稲	ウリカ	200g/10a	移植後10日～Ⅾ ¹⁴ 葉期 ただし、収穫60日前まで	2回以内	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツハイ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
ウイングラフロアブル	イ°フェンカハゾ°ン°ブ°ロエ°フ°ド°ハ°ン°ス°ル°フ°ロ°ン°メ°ル°水°和°剤	移植水稲	ア°ミ°ト°ロ°藻°類°に°よ°る°表°層°は°く°離°	500mL/10a	移植直後～北°I2.5葉期 但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			ウ°リ°カ°							
			オ°モ°ダ°カ°							
			ク°ク°ワ°イ°							
			シ°ス°イ°							
			セ°リ°							
			ヒ°ル°ム°シ°							
			ハ°ラ°オ°モ°ダ°カ°							
			ホ°タル°イ°							
			マ°ツ°ハ°イ°							
			ミ°ス°ガ°ヤ°ツ°リ° 一年生雑草							
ウルティEZ350FG	シ°ク°ロ°ビ°リ°モ°レ°ト°ビ°ラ°ソ°レ°ト°ブ°ロ°ヒ°リ°ス°ル°フ°ロ°ン°粒°剤	移植水稲	イ°ン°ノ°サ°マ°カ°サ°	350g/10a	移植後5日～北°I3葉期 但し、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			一年生雑草							
			多年生広葉雑草							
カイクヰフロアブル	イ°フェンカハゾ°ン°テ°リ°ル°ト°リ°オ°ン°ブ°ロ°ヒ°リ°ス°ル°フ°ロ°ン°水°和°剤	移植水稲	一年生雑草	500mL/10a	移植後3日～北°I3葉期 但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			多年生広葉雑草							
カウソルコン°リ°ト°フロアブル	テ°リ°ル°ト°リ°オ°ン°ト°リア°ファ°モン°水°和°剤	移植水稲	ウ°リ°カ°	500mL/10a	移植後5日～北°I3.5葉期 但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。薬害を生じるおそれがあるので、後作物としてなす、たまねぎおよびさやえんどうは栽培しないこと。	普
			オ°モ°ダ°カ°							
			キ°シュ°ウ°ス°メ°ノ°ヒ°							
			ク°ク°ワ°イ°							
			コ°ウ°キ°ガ°ラ°							
			セ°リ°							
			ヒ°ル°ム°シ°							
			ハ°ラ°オ°モ°ダ°カ°							
			ホ°タル°イ°							
			マ°ツ°ハ°イ°							
			ミ°ス°ガ°ヤ°ツ°リ° 一年生雑草							
カクシフロアブル	イ°フェンカハゾ°ン°ジ°メ°ス°ル°ファ°ゼ°ット°テ°リ°ル°ト°リ°オ°ン°水°和°剤	移植水稲	ウ°リ°カ°	500mL/10a	移植直後～北°I3葉期 但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			オ°モ°ダ°カ°							
			ク°ク°ワ°イ°							
			コ°ウ°キ°ガ°ラ°							
			セ°リ°							
			ヒ°ル°ム°シ°							
			ホ°タル°イ°							
			マ°ツ°ハ°イ°							
			ミ°ス°ガ°ヤ°ツ°リ° 一年生雑草							

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
カシノ楽粒	イ ^o フェンカハ ^o ゾ ^o ン ^o ジ ^o メス ^o ル ^o ファゼ ^o ット ^o テリ ^o ルト ^o リオン ^o 粒 ^o 剤	移植 水稻	ウ ^o リ ^o カ ^o	250g/ 10a	移植直後 ～ ^o ル ^o I ^o 3 ^o 葉 ^o 期 但し、 移植後30 日まで	1回	湛水散 布、水口 施用又は 無人航空 機による 散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			オ ^o モ ^o ダ ^o カ ^o							
			ク ^o ク ^o ワ ^o イ							
			コ ^o ウ ^o キ ^o ガ ^o ラ							
			セ ^o リ							
			ヒ ^o ル ^o ム ^o シ ^o ロ							
			ホ ^o タル ^o イ							
			マ ^o ツ ^o バ ^o イ							
			ミ ^o ス ^o ガ ^o ヤ ^o ツ ^o リ							
			一年生雑草							
カト ^o キ ^o ズ ^o 楽 ^o 粒	プ ^o ロ ^o リ ^o ス ^o ル ^o フ ^o ン ^o フ ^o ロ ^o ル ^o ラ ^o キ ^o シ ^o フェ ^o ン ^o ベ ^o ン ^o ジ ^o ル ^o 粒 ^o 剤	移植 水稻	ウ ^o リ ^o カ ^o	250g/ 10a	移植後3日 ～ ^o ル ^o I ^o 3 ^o 葉 ^o 期 但し、 移植後30 日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又は 無人航空 機による 散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			オ ^o モ ^o ダ ^o カ ^o							
			ク ^o ク ^o ワ ^o イ							
			コ ^o ウ ^o キ ^o ガ ^o ラ							
			セ ^o リ							
			ヒ ^o ル ^o ム ^o シ ^o ロ							
			ホ ^o タル ^o イ							
			マ ^o ツ ^o バ ^o イ							
			ミ ^o ス ^o ガ ^o ヤ ^o ツ ^o リ							
			一年生雑草							
カホ ^o シ ^o ル ^o フ ^o ア ^o ブ ^o ル	イ ^o フェンカハ ^o ゾ ^o ン ^o テ ^o リ ^o ルト ^o リオン ^o ヘ ^o ン ^o ス ^o ル ^o フ ^o ン ^o メ ^o チ ^o ル ^o 水 ^o 和 ^o 剤	移植 水稻	ア ^o オ ^o ミ ^o ト ^o ロ ^o 藻 ^o 類 ^o によ ^o る ^o 表 ^o 層 ^o は ^o く ^o 離 ^o	500mL /10a	移植直後 ～ ^o ル ^o I ^o 2.5 ^o 葉 ^o 期但し、 移植後30 日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人 ^o リ ^o コ ^o タ ^o ー ^o による滴 ^o 下		無人 ^o リ ^o コ ^o タ ^o ー ^o による滴 ^o 下 のみとす る。	普
			ウ ^o リ ^o カ ^o							
			オ ^o モ ^o ダ ^o カ ^o							
			ク ^o ク ^o ワ ^o イ							
			セ ^o リ							
			ヒ ^o ル ^o ム ^o シ ^o ロ							
			ホ ^o タル ^o イ							
			マ ^o ツ ^o バ ^o イ							
			ミ ^o ス ^o ガ ^o ヤ ^o ツ ^o リ							
			水田一年生雑草							
ガ ^o ツ ^o ツ ^o Z200FG	テ ^o リ ^o ルト ^o リオン ^o プ ^o ロ ^o リ ^o ス ^o ル ^o フ ^o ン ^o 粒 ^o 剤	移植 水稻	ア ^o オ ^o ミ ^o ト ^o ロ ^o 藻 ^o 類 ^o によ ^o る ^o 表 ^o 層 ^o は ^o く ^o 離 ^o	200g/ 10a	移植後3日 ～ ^o ル ^o I ^o 3.5 ^o 葉 ^o 期 た ^o だ し、収 ^o 穫 ^o 60 日前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は無 人航空機 による散 布		無人航空機 による散 布のみと する。	普
			ウ ^o リ ^o カ ^o							
			オ ^o モ ^o ダ ^o カ ^o							
			ク ^o ク ^o ワ ^o イ							
			コ ^o ウ ^o キ ^o ガ ^o ラ							
			セ ^o リ							
			ヒ ^o ル ^o ム ^o シ ^o ロ							
			ヘ ^o ラ ^o オ ^o モ ^o ダ ^o カ ^o							
			ホ ^o タル ^o イ							
			マ ^o ツ ^o バ ^o イ							
ミ ^o ス ^o ガ ^o ヤ ^o ツ ^o リ										
一年生雑草										

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
ガットZ70アブル	テフルトリオン・ピラコニル水和剤	移植 水稻	アミト・ロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植後3日～北I3.5葉期 ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			ウリカ							
			オモダカ							
			クダマ							
			コウキガラ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ハラオモダカ							
			ホタルイ							
			マツバ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										
ガット400FG	イマゾスルフォン・テフルトリオン・ピラコニル粒剤	移植 水稻	アミト・ロ・藻類による表層はく離	400g/10a	移植直後～北I2.5葉期 ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			ウリカ							
			オモダカ							
			クダマ							
			コウキガラ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ハラオモダカ							
			ホタルイ							
			マツバ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										
ガット70アブル	イマゾスルフォン・テフルトリオン・ピラコニル水和剤	移植 水稻	アミト・ロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植直後～北I2.5葉期 ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			ウリカ							
			オモダカ							
			クダマ							
			コウキガラ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							
無人航空機による滴下のみとする										
無人航空機による滴下のみとする。										

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
キマリテフロアブル	イゾフェンカバゾン・テフリトリオン水和剤	移植水稻	アオイトロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植直後～北I3葉期但し、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下		無人ヘリコプターによる滴下のみとする。	普
			ウリカ							
			オモダカ							
			ククワイ							
			スイ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ヘラオモダカ							
			ホタルイ							
			マツバ							
			ミスガヤツリ							
			水田一年生雑草							
キラ400FG	イマゾスルフロン・テフリトリオン・ピラクロニル粒剤	移植水稻	アオイトロ・藻類による表層はく離	400g/10a	移植直後～北I2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			ウリカ							
			オモダカ							
			ククワイ							
			コウキガラ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ヘラオモダカ							
			ホタルイ							
			マツバ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							
キラフロアブル	イマゾスルフロン・テフリトリオン・ピラクロニル水和剤	移植水稻	アオイトロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植直後～北I2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			ウリカ							
			オモダカ							
			ククワイ							
			コウキガラ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							
			クサバルカンフロアブル							
オモダカ										
ククワイ										
ヒルムシロ										
ヘラオモダカ										
ホタルイ										
マツバ										
ミスガヤツリ										
一年生雑草										

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
クリンチャー-EW	シロホップ・フチル乳剤	移植水稻	ル ¹ I	100mL/10a	移植後20日~ル ¹ I4.5葉期 但し、収穫30日前まで	2回以内	無人航空機による散布			普
ゲバートIA-粒剤	ダイムン・ピラコニル・ベンゾピシロン・メゾスルフロ粒剤	移植水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	400g/10a	移植後14日~ル ¹ I4葉期 ただし、収穫60日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
ゲバートギアA-粒剤	シロ ¹ リモレート・フェキトリオン・メゾスルフロ ¹ 粒剤	移植水稻	ウリカ	300g/10a	移植後14日~ル ¹ I4葉期 ただし、収穫60日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による滴下のみとする。	普
			オタカ							
			ククワイ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ヘラオタカ							
			ホタルイ							
			マツハイ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							
サガケ楽粒	イブ ¹ フェンカハゾン・テフリトリオン・フロルピラウキフェンベンゾ ¹ ル粒剤	移植水稻	ウリカ	250g/10a	移植直後~ル ¹ I3葉期 但し、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			エゾノヤスガサ							
			オタカ							
			ククワイ							
			シスイ							
			セリ							
			ナガエツルノゲイトウ							
			ヒルムシロ							
			ヘラオタカ							
			ホタルイ							
マツハイ										
ミスガヤツリ										
一年生雑草										
サスケ粒剤200	カフェストロール・シロスルファミロン・ダイムン・ベンゾピシロン ¹ 粒剤	移植水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	200g/10a	移植後3日~ル ¹ I2葉期 ただし、移植後30日まで	1回	水口施用、湛水散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			ウリカ							
			オタカ							
			ククワイ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ヘラオタカ							
			ホタルイ							
			マツハイ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
サブレット GO400FG	イマゾスルフォン・ ピラクロニル・ プロモト 粒剤	移植 水稻	アミト・ロ・藻類による 表層はく離	400g/ 10a	移植直後 ～北 I2.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			ウリカ							
			オモダカ							
			ククワイ							
			コウキガラ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツハイ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										
サブレット GO70 アブル	イマゾスルフォン・ ピラクロニル・ プロモト 水和剤	移植 水稻	アミト・ロ・藻類による 表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～北 I2.5 葉期 ただ し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普
			ウリカ							
			オモダカ							
			ククワイ							
			コウキガラ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ハラオモダカ							
			ホタルイ							
			マツハイ							
ミスガヤツリ										
一年生雑草										
サブレット KAI400FG	イマゾスルフォン・ ピラクロニル 粒剤	移植 水稻	ウリカ	400g/ 10a	移植直後 ～北 I2.5 葉期 但 し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			オモダカ							
			ククワイ							
			コウキガラ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツハイ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							
サブレット KAI7 0アブル	イマゾスルフォン・ ピラクロニル 水和剤	移植 水稻	アミト・ロ・藻類による 表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～北 I2.5 葉期ただ し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布又は 無人ヘリ コプター による滴 下		無人ヘリコ プターに よる滴下 のみとす る。	普
			ウリカ							
			オモダカ							
			ククワイ							
			コウキガラ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツハイ							
			ミスガヤツリ							
水田一年生雑草										

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壤	備考	毒 性										
ジェイソウルフロアブル	シロピリレートピラゾレートフェントサミト水和剤	移植 水稻	アミトロ・藻類による表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～Ⅾ ^{12.5} 葉期ただし、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普										
			ウリカ																	
			エノヤヌカサ																	
			オタカ																	
			シスイ																	
			セリ																	
			ヒルムシロ																	
			ハラオタカ																	
			ホタルイ																	
			マツバ																	
			ミスガヤツリ																	
			一年生雑草																	
ジェイフレンド400FG	オキサジクロホクンテフルトリオンピラクロニル粒剤	移植 水稻	ウリカ	400g/ 10a	移植後5日 ～Ⅾ ¹³ 葉 期 だ し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普										
			オタカ																	
			ククワイ																	
			セリ																	
			ヒルムシロ																	
			ハラオタカ																	
			ホタルイ																	
			マツバ																	
			ミスガヤツリ																	
			一年生雑草																	
			ジャンタルムMX豆つぶ250								ピリフリット・ピリミスファンメトリオン剤	移植 水稻	一年生雑草	250g/ 10a	移植後3日 ～Ⅾ ^{13.5} 葉期だ し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
													多年生広葉雑草							
ゼータイガ-300FG	プロピリスルホンプロモチド・ペンタサゾン粒剤	移植 水稻	アミトロ・藻類による表層はく離	300g/ 10a	移植後3日 ～Ⅾ ¹³ 葉 期だ し、移植後 30日 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普										
			エノヤヌカサ																	
			一年生雑草																	
ゼータイガ-フロアブル	プロピリスルホンプロモチド・ペンタサゾン水和剤	移植 水稻	アミトロ・藻類による表層はく離	500mL /10a	移植後3日 ～Ⅾ ¹³ 葉 期だ し、移植後 30日 まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普										
			ウリカ																	
			エノヤヌカサ																	
			オタカ																	
			ククワイ																	
			コウキガラ																	
			シスイ																	
			セリ																	
			ヒルムシロ																	
			ハラオタカ																	
			ホタルイ																	
			マツバ																	
ミスガヤツリ																				
水田一年生雑草																				

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
セーファラ 200FG	フェンキトリオン・ プロピルスルホン 剤	移植 水稻	イノノチカサ	200g/ 10a	移植後3日 ～ 14葉 期 ただ し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又は 無人航空 機による 散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			一年生雑草							
			多年生広葉雑草							
ダクショット 200SD粒剤	カエストロール・ フルビラウキ フェンピル ベンゾヒシロ ン剤	移植 水稻	ウリカ	200g/ 10a	移植後3日 ～ 13葉 期 ただ し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又は 無人航空 機による 散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			イノノチカサ							
			オモカ							
			セリ							
			ヒルムシ							
			ハラモカ							
			ホタルイ							
			マツバ							
			ミスガヤリ							
一年生雑草										
ツキ 250粒剤	イフェンカハ ゾン・イソ フロン・ベン ゾヒシロ ン剤	移植 水稻	一年生雑草	250g/ 10a	移植直後 ～ 12.5 葉期 但 し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又は 無人航空 機による 散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			多年生広葉雑草							
ティオレア粒 剤	オキサメ チル・テフ トリオン・ メタスル ホン剤	移植 水稻	一年生雑草及び多 年生広葉雑草	400g/ 10a	移植後1日 ～ 13葉 期 ただ し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布又は 無人航空 機による 散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
トリニフロアブル	イフェンカハ ゾン・テフ トリオン・ メタスル ホン剤	移植 水稻	アミド・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	移植直後 ～ 12.5 葉期 但 し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			ウリカ							
			オモカ							
			ククワイ							
			シスイ							
			セリ							
			ヒルムシ							
			ハラモカ							
			ホタルイ							
			マツバ							
			ミスガヤリ							
水田一年生雑草										

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
ハッチリ400FG	イマゾスルホン・ピラコロール・プロモプチド粒剤	移植水稻	アオイトモ・藻類による表層はく離	400g/10a	移植直後～ル I2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			ウリカ							
			オモダカ							
			ククワイ							
			コウキガラ							
			スイ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ハラオモダカ							
			ホタルイ							
			マツハイ							
			ミスガヤツリ							
水田一年生雑草										
ハッチリLX400FG	イマゾスルホン・ピラコロール・プロモプチド粒剤	移植水稻	一年生雑草	400g/10a	移植直後～ル I2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			多年生広葉雑草							
ハッチリLX700アール	イマゾスルホン・ピラコロール・プロモプチド水和剤	移植水稻	ウリカ	500mL/10a	移植直後～ル I2.5葉期ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			イソノヤスカグサ							
			オモダカ							
			ククワイ							
			コウキガラ							
			スイ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ハラオモダカ							
			ホタルイ							
			マツハイ							
			ミスガヤツリ							
水田一年生雑草										
ヒエカーン豆つぶ250	ピリミハクメキル剤	移植水稻	ル I	250g/10a	移植後15日～ル I4葉期但し、収穫45日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
ハンカイ豆つぶ250	ピリミルファン・フェキサスルホン・ベンゾピシロン剤	移植水稻	アオイトモ・藻類による表層はく離	250g/10a	移植後3日～ル I3葉期但し、移植後30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			一年生雑草							
			多年生広葉雑草							

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
ホットコピ [®] 200粒剤	テトルコール [®] ・ハッヅビ [®] シクロン粒剤	移植 水稻	ヒルムシロ	200g/ 10a	移植直後 ~ Ⅾ [®] I2葉期 ただし、移植後 30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			ホタルイ							
			マツハ [®] イ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							
ホットコピ [®] フロアフル	テトルコール [®] ・ハッヅビ [®] シクロン水和剤	移植 水稻	ヒルムシロ	300mL /10a	植代後~ 移植前7日 または移植直後~ Ⅾ [®] I1.5葉期 ただし、移植後 30日まで	2回以 内	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		移植前に処理しない。無人航空機による滴下のみとする。	普
			ハラオモダ [®] カ							
			ホタルイ							
			マツハ [®] イ							
			ミスガヤツリ							
		一年生雑草								
		ヒルムシロ	500mL /10a	移植直後 ~ Ⅾ [®] I2葉期 ただし、移植後 30日まで				無人航空機による滴下のみとする。		
										ハラオモダ [®] カ
										ホタルイ
										マツハ [®] イ
ミスガヤツリ										
一年生雑草										
ホ [®] テ [®] - ガ [®] - ド [®] フ [®] ロ [®] フ [®] ア [®] ブ [®] ル	テフルトリオン [®] ・トリアフェモン水和剤	移植 水稻	ウリカ	500mL /10a	移植後5日 ~ Ⅾ [®] I3.5葉期 ただし、移植後 30日まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			オモダ [®] カ							
			キシュウス [®] メルヒ							
			クク [®] ワイ							
			コウキガ [®] ラ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ハラオモダ [®] カ							
			ホタルイ							
			マツハ [®] イ							
ミスガヤツリ										
一年生雑草										
メガセ [®] - 4400FG	ヒ [®] ラ [®] コ [®] ル [®] ・ プ [®] ロ [®] リス [®] フ [®] ロ [®] ン [®] ・ プ [®] ロ [®] モ [®] チ [®] ド [®] 粒剤	移植 水稻	アオミ [®] ロ [®] 藻類による表層はく離	400g/ 10a	移植後5日 ~ Ⅾ [®] I3葉期 ただし、収穫60日 前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			一年生雑草							
			多年生広葉雑草							
レオセ [®] - 4300FG	フェンキトリオン [®] ・プロ [®] ロ [®] リス [®] フ [®] ロ [®] ン [®] ・ プ [®] ロ [®] モ [®] チ [®] ド [®] 粒剤	移植 水稻	ウリカ	300g/ 10a	移植後3日 ~ Ⅾ [®] I4葉期 ただし、移植後 30日まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			オモダ [®] カ							
			クク [®] ワイ							
			コウキガ [®] ラ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ハラオモダ [®] カ							
			ホタルイ							
			マツハ [®] イ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
レ ^レ ラス ^ア ア ⁻ 粒 ^剤	ジ ^メ ト ^リ ン [・] タ ^イ ム ^ロ ン [・] テ ^リ ル ^ト リ ^オ ン [・] メ ^タ ゾ [・] ス ^ル フ ^ロ ン [・] 粒 ^剤	移植 水稻	一年生雑草及び多 年生広葉雑草	400g/ 10a	移植後14 日～レ ^レ I4 葉期 ただ し、収穫60 日前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
ワ ^イ ト [・] ア ^タ ック ^{SC}	ヘ [・] ノ ^キ ス ^ラ ム ^水 和 ^剤	移植 水稻	オ ^タ カ レ ^レ I	100mL /10a	移植後20 日(稲5葉 期以降)～ レ ^レ I6葉期 但し、収穫 30日前ま で	2回以 内	無人航空 機による 散布			普
ワ ^ガ ア ^リ 楽 ^粒	イ [・] フェ ^ン カ ^ハ ゾ ^ン ・テ ^リ ル ^ト リ ^オ ン [・] 粒 ^剤	移植 水稻	ウ ^リ カ オ ^タ カ ク ^ク ワ ^イ セ ^リ ヒ ^ル ム ^シ ホ ^タ ル ^イ マ ^ツ バ ^イ ミ ^ス ガ ^ヤ ツ ^リ 一年生雑草	250g/ 10a	移植直後 ～レ ^レ I3葉 期 但し、 移植後30 日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又は 無人航空 機による 散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
銀 ^河 I ^ア -粒 ^剤	ジ ^メ ス ^ル フ ^ア セ [・] ッ ト [・] ピ [・] ラ ^ク ロ ^ニ ル [・] メ ^タ ゾ [・] ス ^ル フ ^ロ ン [・] 粒 ^剤	移植 水稻	ウ ^リ カ オ ^タ カ ク ^ク ワ ^イ コ ^ウ キ ^ガ ラ セ ^リ ヒ ^ル ム ^シ ヘ ^ラ オ ^タ カ ホ ^タ ル ^イ マ ^ツ バ ^イ ミ ^ス ガ ^ヤ ツ ^リ 一年生雑草	400g/ 10a	移植後3日 ～レ ^レ I3葉 期 ただ し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布又は無 人航空機 による散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
銀 ^河 フ ^ロ ア ^プ ル	ジ ^メ ス ^ル フ ^ア セ [・] ッ ト [・] ピ [・] ラ ^ク ロ ^ニ ル [・] メ ^タ ゾ [・] ス ^ル フ ^ロ ン [・] 水 ^和 剤	移植 水稻	ウ ^リ カ オ ^タ カ ク ^ク ワ ^イ セ ^リ ヒ ^ル ム ^シ ヘ ^ラ オ ^タ カ ホ ^タ ル ^イ マ ^ツ バ ^イ ミ ^ス ガ ^ヤ ツ ^リ 一年生雑草	500mL /10a	移植後3日 ～レ ^レ I3葉 期 ただ し、移植後 30日まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普
天 ^空 I ^ア -粒 ^剤	フェ ^ン ト ^ラ サ [・] ミ ド [・] ヘ [・] ン [・] ソ [・] ビ シ ^ク ロ ^ン ・メ ^タ ゾ [・] ス ル ^フ ロ ^ン 粒 ^剤	移植 水稻	一年生雑草 多 年生広葉 雑草	300g/ 10a	移植後1日 ～レ ^レ I3葉 期 ただ し、移植後 30日まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
天空700Aブル	フェントキサミド・ベンゾピシロリン・メタゾスルフロン水和剤	移植 水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	500mL/10a	移植直後～ $1/3$ 葉期 ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
流星I7-粒剤	フェントリオン・ペンタザン・メタゾスルフロン粒剤	移植 水稻	一年生雑草及び多年生広葉雑草	400g/10a	移植後3日～ $1/3$ 葉期 ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
アットウZ700Aブル	テフルトリオン・ピラクロニル・プロピルシロリン水和剤	直播 水稻	ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草	500mL/10a	稲1葉期～ $1/3$ 葉期 ただし、収穫90日前まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
アッパレZ400FG	ピラクロニル・プロピルシロリン・プロモト粒剤	直播 水稻	ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草	400g/10a	稲1葉期～ $1/3$ 葉期 ただし、収穫90日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
アトリ豆つぶ250	ピリメスファン剤	直播 水稻	オモタカ クワケワイ	250g/10a	稲5葉期～ 収穫45日前まで	1回	湛水散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
イネキング700Aブル	ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾピシロリン水和剤	直播 水稻	ウリカ ヒルムシロ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草	500mL/10a	稲1葉期～ $1/2.5$ 葉期 ただし、収穫90日前まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
ウイニングラン700Aブル	イソフェンカルバゾン・プロモト・ベンゾピラメチル水和剤	直播 水稻	ウリカ セリ ヒルムシロ ヘラオモタカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草	500mL/10a	稲1葉期～ $1/2.5$ 葉期 但し、収穫90日前まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
ウルティEZ350FG	シロピリメレート・ピラゾレート・プロピルシロリン粒剤	直播 水稻	ウリカ ヒルムシロ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草	350g/10a	稲1葉期～ $1/3.5$ 葉期 ただし、収穫90日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病虫害雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壤	備考	毒性
E-ワンフロアブル	ピラジナクロコリン酸・テフルトリオン水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ 1/3葉期 但し、収穫 90日前ま で	1回	原液湛水 散布又は 水口施用 又は無人 ヘリコプ ターによ る滴下	砂壤 土～ 埴土	無人ヘリコ プターに よる滴下 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバ							
			ミスガヤツリ							
オカセ Z250FG	ピラコニル・プロピル・リスルフロノ粒剤	直播 水稻	アモト・ロ・藻類によ る表層はく離	250g/ 10a	稲1葉期～ 1/3.5葉 期 ただ し、収穫60 日前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			ウリカ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバ							
オカセ Zフロアブル	ピラコニル・プロピル・リスルフロノ水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ 1/3葉期 ただし、収 穫60日前 まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバ							
			ミスガヤツリ							
カイレキZフロアブル	イフェンカルバゾン・テフルトリオン・プロピル・リスルフロノ水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ 1/3葉期 但し、収穫 90日前ま で	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバ							
			ミスガヤツリ							
カウンスルコンプレイトフロアブル	テフルトリオン・トリアフェモン水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	は種直後 ～1/3.5 葉期 ただ し、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。 薬害 を生じるお それがある ので、後作 物としてな す、たまね ぎおよびさ やえんどう は栽培しな いこと。	普
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							
カチホ シフロアブル	イフェンカルバゾン・テフルトリオン・ペンシルフロノメチル水和剤	直播 水稻	アモト・ロ・藻類によ る表層はく離	500mL /10a	稲1葉期～ 1/2.5葉 期 但し、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人ヘリ コプターに よる滴下		無人ヘリコ プターに よる滴下 のみとす る。	普
			ウリカ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバ							
ミスガヤツリ										
水田一年生雑草										

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
ガットZ200FG	テフルトリオン・プロピリスルホン剤	直播水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	200g/10a	稲1葉期～ 1/3葉期 ただし、収穫60日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			ウリカ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										
ガットZフロアブル	テフルトリオン・プロピリスルホン水和剤	直播水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	稲1葉期～ 1/3葉期 ただし、収穫90日前まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			ウリカ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										
カレット400FG	イマゾスルホン・テフルトリオン・ピラクロニル剤	直播水稻	ウリカ	400g/10a	稲1葉期～ 1/2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										
カレットフロアブル	イマゾスルホン・テフルトリオン・ピラクロニル水和剤	直播水稻	ウリカ	500mL/10a	稲1葉期～ 1/2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										
キラテフロアブル	イソフェンカルボン・テフルトリオン水和剤	直播水稻	アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	稲1葉期～ 1/3葉期 但し、収穫90日前まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			ウリカ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
水田一年生雑草										
キラ400FG	イマゾスルホン・テフルトリオン・ピラクロニル剤	直播水稻	ウリカ	400g/10a	稲1葉期～ 1/2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壤	備考	毒 性
キラフロアブル	イマゾスルフロン・ テフルトリオン・ ピラクロニル水 和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ ルI2.5葉 期 ただ し、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										
クサルカンフロアブル	ピラクロニル・ピ ラゾレート・ベン ゾピシロン水 和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ ルI2.5葉 期 ただ し、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							
クインチャー-EW	シロホップ・ブチ ル乳剤	直播 水稻	一年生イネ科雑草	100mL /10a	は種後10 日～ルI 4.5葉期 但し、収穫 30日前ま で	2回以 内	無人航空 機による 散布			普
ゲハートエア-粒 剤	タイムロン・ピラ クロニル・ベン ゾピシロン・メ ゾスルフロン粒 剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ ルI4葉期 ただし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										
サガケ楽粒	イブフェンカルバ ゾン・テフルトリ オン・フロピラ キフェベンゾ ル粒剤	直播 水稻	ウリカ	250g/ 10a	稲1葉期～ ルI2.5葉 期 但し、 収穫90日 前まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										
サスケ粒剤200	カフェンストロル・ シクロスルファミ ン・タイムロン・ ベンゾピシロン 粒剤	直播 水稻	ウリカ	200g/ 10a	稲1葉期～ ルI2葉期 ただし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										
サブレット GO400FG	イマゾスルフロン・ ピラゾレート・ ベンゾピラクロ ニル・ピラゾレ ート・ベンゾピ シロン・ピラ クロニル・ブチ ル粒剤	直播 水稻	アモドロ・藻類によ る表層はく離	400g/ 10a	稲1葉期～ ルI2.5葉 期 ただ し、収穫90 日前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			ウリカ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
サブレット GO70アブル	イマゾスルホン・ ピラゾリン・ ピラゾール・ ピロピロリン 水和剤	直播 水稻	アオミドロ・藻類による 表層はく離 ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草	500mL /10a	稲1葉期～ 1/2.5葉 期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普
サブレット KAI400FG	イマゾスルホン・ ピラゾリン・ ピラゾール 粒剤	直播 水稻	ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ ミスガヤツリ 一年生雑草	400g/ 10a	稲1葉期～ 1/2.5葉 期 但し、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普
サブレット KAI70アブル	イマゾスルホン・ ピラゾリン・ ピラゾール 水和剤	直播 水稻	ウリカ セリ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 水田一年生雑草	500mL /10a	稲1葉期～ 1/2.5葉 期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人ヘリ コプター による滴 下		無人ヘリコ プターに よる滴下 のみとする。	普
ジェイソウルフロアブル	シクロピリメ トピラゾ レート・ フェントサ ミド水和剤	直播 水稻	ウリカ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草	500mL /10a	稲1葉期～ 1/2.5葉 期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航 空機によ る滴下		無人航空機 による滴下 のみとする。	普
ジェイフレッド 400FG	ピラゾリン・ ピラゾール 水和剤	直播 水稻	ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草	400g/ 10a	稲1葉期～ 1/2.5葉 期 ただし、 収穫60日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普
ジャンタルMX豆 つぶ250	ピラゾリン・ ピラゾール 水和剤	直播 水稻	ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草	250g/ 10a	稲1葉期～ 1/3.5葉 期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普
ゼータタイガ 300FG	ピラゾリン・ ピラゾール 水和剤	直播 水稻	アオミドロ・藻類による 表層はく離 ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草	300g/ 10a	稲1葉期～ 1/3葉期 ただし、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとする。	普

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
ゼータイガ-フロアブル	フロピリスルホン・プロモチド・ペンタザロン水和剤	直播水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	稲1葉期～ 1/13葉期 ただし、収穫90日前まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			ウリカ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
水田一年生雑草										
ゼータグラス200FG	フェンキトリオン・フロピリスルホン粒剤	直播水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	200g/10a	稲1葉期～ 1/14葉期 ただし、収穫75日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			ウリカ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										
ダクショット200SD粒剤	カフェンストール・フロピラキフェンペンシルベンゾピシロン粒剤	直播水稲	ウリカ	200g/10a	稲1葉期～ 1/13葉期 ただし、収穫90日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							
ツルキ250粒剤	イソフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾピシロン粒剤	直播水稲	ウリカ	250g/10a	稲1葉期～ 1/12.5葉期 但し、収穫90日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							
デューリアー粒剤	オキサジクロキノン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン粒剤	直播水稲	ウリカ	400g/10a	稲1葉期～ 1/13葉期 ただし、収穫90日前まで	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布		無人航空機による散布のみとする。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							
トリニティフロアブル	イソフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ペンシルフロメチル水和剤	直播水稲	アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	稲1葉期～ 1/12.5葉期 但し、収穫90日前まで	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下		無人航空機による滴下のみとする。	普
			ウリカ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ヘラオモダカ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
ミスガヤツリ										
水田一年生雑草										

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫雑草名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	適用土 壤	備考	毒 性
ハッチリ400FG	イマゾスルフロン・ ピラクロニル・ブ ロメブチド粒 剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ ルI2.5葉 期ただし、 収穫90日 前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツハイ							
			ミスガヤツリ							
ハッチリLX400FG	イマゾスルフロン・ 林サシクモホ ンピラクロニル・ ブロメブチド 粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ ルI2.5葉 期た だし、収穫90 日前まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散 布、水口 施用又は 無人航 空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			セリ							
			ホタルイ							
			マツハイ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							
ハッチリLX700ア ール	イマゾスルフロン・ 林サシクモホ ンピラクロニル・ ブロメブチド 水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ ルI2.5葉 期た だし、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ハラモダカ							
			ホタルイ							
			マツハイ							
ヒエグリーン豆つぶ 250	ピリミハクメ ル剤	直播 水稻	ルI	250g/ 10a	稲3葉期～ ルI3葉期 但し、収穫 45日前ま で	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			アオイトロ							
			アオイトロ							
			アオイトロ							
			アオイトロ							
			アオイトロ							
ハンカイ豆つぶ 250	ピリミスルファン フェキサスルホ ンベンゾピシロ ン剤	直播 水稻	アオイトロ・藻類によ る表層はく離	250g/ 10a	稲1葉期～ ルI3葉期 但し、収穫 90日前ま で	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			ウリカ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			ミスガヤツリ							
ホテガードフ ロアール	テフルトリオン・ト リアフェモン水和 剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	は種直後 ～ルI3.5 葉期た だし、収穫90 日前まで	1回	原液湛水 散布、水 口施用又 は無人航 空機に よる滴 下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツハイ							
			ミスガヤツリ							
			一年生雑草							
メガゼータ400FG	ピラクロニル・ブ ロリスルフロン 粒剤	直播 水稻	アオイトロ・藻類によ る表層はく離	400g/ 10a	稲1葉期～ ルI3葉期 ただし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散 布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			ウリカ							
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			ミスガヤツリ							
一年生雑草										

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は原則令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病虫害雑草名	希釈倍数使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	備考	毒性
レオラスIA-粒剤	ジメトリン・ ダイムン・テリ トリオン・メタゾ スルホン粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ ルI4葉期 ただし、収 穫60日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
ワイドアタックSC	ヘキサスラム水 和剤	直播 水稻	ルI	100mL /10a	稲3葉期～ ルI5葉期 但し、収 穫30日前 まで	2回以 内	無人航空 機による 散布			普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
銀河IA-粒 剤	ジメスルファセ ット・ピラクロニル メタゾスルホン 粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ ルI3葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
銀河70アブル	ジメスルファセ ット・ピラクロニル メタゾスルホン 水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ ルI3葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
天空IA-粒剤	フェントキサミ ド・ベンゾピ シロン・メタゾス ルホン粒剤	直播 水稻	ウリカ	300g/ 10a	稲1葉期～ ルI3葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	湛水散 布、湛水 周縁散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
天空70アブル	フェントキサミ ド・ベンゾピ シロン・メタゾス ルホン水和剤	直播 水稻	ウリカ	500mL /10a	稲1葉期～ ルI3葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	原液湛水 散布又は 無人航空 機による 滴下		無人航空機 による滴下 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							
流星IA-粒剤	フェンキトリオン ・ペンタザン メタゾスルホン 粒剤	直播 水稻	ウリカ	400g/ 10a	稲1葉期～ ルI3葉期 ただし、収 穫90日前 まで	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布		無人航空機 による散布 のみとす る。	普
			セリ							
			ヒルムシロ							
			ホタルイ							
			マツバイ							
			ミスガヤツリ							

(3) 麦類・大豆(殺菌・殺虫剤)

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	備考	毒性
シバキアフロアブル	テコナゾール水和剤	大麦	うどんこ病	16倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普
		小麦			収穫7日前まで				
		大麦	赤かび病		収穫14日前まで				
		小麦			収穫7日前まで				
フルト乳剤25	ブピコナゾール乳剤	大麦	赤かび病	8倍	収穫21日前まで	1回	無人航空機による散布		普
		小麦			収穫7日前まで	3回以内			
トップジンMZ	チオファネートメチル水和剤	小麦	赤かび病	8倍	収穫14日前まで	3回以内(出穂期以降は2回以内)	無人航空機による散布		普
		麦類(小麦を除く)			収穫21日前まで	3回以内(出穂期以降は1回以内)			
ミビクスフロアブル	ビシフルメトフェン水和剤	大麦	赤かび病	8~16倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普
		小麦			収穫7日前まで				
ワケアップフロアブル	メコナゾール水和剤	麦類	うどんこ病	10~16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布		普
			黄斑病						
			赤かび病	10~24倍					
			赤さび病	10~16倍					
スミチオン乳剤	MEP乳剤	小麦	アブラムシ類	8倍	収穫7日前まで	1回	無人航空機による散布		普
		大麦							
アミスター20フロアブル	アジキストロビン水和剤	だいち	紫斑病	16~24倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普
ジマンダイオン水和剤	マンゼブ水和剤	だいち	べと病	5倍	収穫45日前まで	3回以内	無人航空機による散布		普
			紫斑病						
トライフロアブル	テコナゾール水和剤	だいち	紫斑病	16倍	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普
				8倍					
ファンタジスタフロアブル	ビリンカルブ水和剤	だいち	菌核病	16倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布		普
			紫斑病						
フェキフロアブル	ビリタクロメチル水和剤	だいち	紫斑病	24~32倍	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布		普
ブランドム乳剤25	ジフェノコナゾール乳剤	だいち	紫斑病	16~24倍	開花後~収穫7日前まで	2回以内	無人飛行機による散布		普
エキシードフロアブル	スルホキサフル水和剤	だいち	カラムシ類	16倍	収穫14日前まで	3回以内	無人航空機による散布		普
スタークルメイト液剤10	ジネフラン液剤	だいち	カラムシ類	8倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普
			ダズサタバ						
			フタスジヒメムシ						

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	備考	毒性
スタークル液剤10	ジ [®] ノフラン液剤	だいでず	カメムシ類	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人航空機 による散布		普
			ダ [®] イス [®] サヤマハ E						
			フタスジ [®] ヒメムシ						
スミチオン乳剤	MEP乳剤	だいでず	ウコンノメイカ [®]	8倍	収穫21日 前まで	4回以内	無人航空機 による散布		普
			カメムシ類						
			シロイチモン [®] マダ [®] ラ メイカ [®]						
			ダ [®] イス [®] サヤマハ E						
			ダ [®] イス [®] サヤマシカ [®]						
			マメシクイカ [®]						
トルボ [®] ニア-	イトフェン [®] ロックス 乳剤	だいでず	カメムシ類	8倍	収穫14日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布		普
			ツメクサガ [®]						
			ハスモンヨトウ						
			マメシクイカ [®]						
トルボ [®] ンスカイMC	イトフェン [®] ロックス マイクロカ [®] セル剤	だいでず	カメムシ類	8~16倍	収穫14日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布		普
			ハスモンヨトウ						
			マメシクイカ [®]	16倍					
				8倍					
ノモルト乳剤	テフルハ [®] ンス [®] ロン 乳剤	だいでず	ハスモンヨトウ	8~16倍	収穫14日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布		普
プレオロア [®] ブル	ピ [®] リタ [®] リル水和 剤	だいでず	オオタバ [®] コガ [®]	8倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人航空機 による散布		普
			ハスモンヨトウ	8~16倍					
プレバ [®] ソフア [®] ブル5	クロナトラニリ [®] ロール水和剤	だいでず	ウコンノメイカ [®]	16~32倍	収穫7日前 まで	2回以内	無人航空機 による散布		普
			オオタバ [®] コガ [®]						
			ハスモンヨトウ						
			マメシクイカ [®]						
プロフレア [®] SC	プロフレリト [®] 水和 剤	だいでず	ウコンノメイカ [®]	16~32倍	収穫前日 まで	3回以内	無人航空機 による散布		普
			オオタバ [®] コガ [®]						
			シロイチモン [®] ヨトウ						
			ダ [®] イス [®] サヤマハ E						
			ツメクサガ [®]						
			ハスモンヨトウ						
			フタスジ [®] ヒメムシ						
			マメシクイカ [®]						
			マメシクイカ [®]						
マメシクイカ [®]									

注意事項

- ・一覧表の農薬登録内容は令和7年10月1日現在のものです。
- ・農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器・包装のラベルに従ってください。
- ・普(普通物)とは、毒物・劇物に該当しないものを指している通称です。

薬剤名	農薬の種類	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	備考	毒性
ベネビ [®] AOD	シアントラニリブ [®] ロール水和剤	だいでず	アブラムシ類	32倍	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布		普
			ハスモンヨトウ						
			マメシクイガ						
マトリックフロアブル	クロマフェニト [®] 水和剤	だいでず	ハスモンヨトウ	8～16倍	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布		普
ミネクトエクストラSC	シアントラニリブ [®] ロールフェロン水和剤	だいでず	カメムシ類	40～80倍	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普
				80～160倍					
			ハスモンヨトウ	40～80倍					
				80～160倍					
			マメシクイガ	40～80倍					
				80～160倍					
ロムタ [®] ソニア-	テブ [®] フェノ [®] ト [®] 水和剤	だいでず	ハスモンヨトウ	16倍	収穫14日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布		普
アミスターレホ [®] NSE	イトフェン [®] ロックス・アゾ [®] キストロビ [®] ン水和剤	だいでず	アブラムシ類	8倍	収穫21日前まで	2回以内	無人航空機による散布		普
			カメムシ類						
			ハスモンヨトウ						
			マメシクイガ						
			紫斑病						